

Asamax 500 30 czopków 500 mg

Nasza cena: 49,76 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 G
Opakowanie	*30
Postać	CZOP.
Producent	ASTELLAS PHARMA SP.Z.O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	MESALAZINUM

Opis produktu

Opis

Tabletki dojelitowe Asamax 500 zawierają substancję czynną mesalazynę. Mesalazyna wywiera bezpośrednie działanie przeciwzapalne. Tabletki dojelitowe Asamax 500 hamują rozwój procesu chorobowego w jelitach.

Wskazania:

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego, zarówno w fazie ostrej, jak i w fazie remisji choroby. Choroba Crohna w obrębie okrężnicy, zarówno w fazie ostrej jak i w fazie remisji choroby.

Kiedy nie stosować leku?

- jeśli pacjent ma uczulenie na mesalazynę/salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Dawkowanie:

Asamax 500 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Dawkowanie i czas leczenia zawsze ustala lekarz w zależności od nasilenia objawów. Pożądane działanie terapeutyczne leczenia mesalazyną można osiągnąć jedynie wówczas, gdy zalecenia dawkowania są konsekwentnie i dokładnie przestrzegane.

Sposób przyjmowania leku:

Tabletki należy połączyć bez rozgryzania, popijając płynem. Przyjmować po posiłku.

Skład:

Jedna tabletkowa dojelitowa leku Asamax 500 zawiera 500 mg mesalazyny.

Pozostałe składniki to:

celuloza mikrokrystaliczna, powidon K25iK90, krzemu dwutlenek koloidalny, krospowidon, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000, kopolimer kwasu metakrylowego -Typ A, kopolimer kwasu metakrylowego -Typ B, trietylu cytrynian, talk, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.