

Ascalcin Plus Cytryna, 10 saszetek



Nasza cena: 13,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	Polfa Łódź S.a.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Ascalcin Plus jest lekiem w postaci proszku musującego o skojarzonym działaniu jego składników.

Dawkowanie - Ascalcin Plus Cytryna, 10 saszetek

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli: przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, w grypie i przeziębieniu 1-2 saszetki 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową - 6 saszetek.

W chorobach reumatycznych - 8 saszetek, podawanych w 4 dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saszetka 3 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę. maksymalna dawka dobową- 4 saszetki.

Składniki - Ascalcin Plus Cytryna, 10 saszetek

Substancje czynne:

- kwas acetylosalicylowy 500 mg,

- kwas askorbowy (witamina C) 300 mg

- wapń w postaci laktogluconianu wapnia 200 mg

oraz substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan (178 mg jonów sodu), kwas cytrynowy, aspartam, aromat cytrynowy lub grejpfrutowy, sodu laurylosiarczan, Beta-karoten, powidon.

Działania

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy leków- niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń krwionośnych. Zmniejszając ich

przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo.

Substancje buforujące zawarte w leku, umożliwiają szybkie i całkowite rozpuszczenie leku Ascalcin Plus w wodzie, dzięki temu łatwo się on wchłania i jest dobrze tolerowany.

Wskazania - Ascalcin Plus Cytryna, 10 saszetek

- gorączka i dolegliwości bólowe związane z przeziębieniem i grypą
- bóle o lekkim i średnim nasileniu (bóle zębów, nerwobóle, bóle stawów i mięśni, bóle głowy, migrena)
- choroby reumatyczne

Przeciwwskazania - Ascalcin Plus Cytryna, 10 saszetek

Kiedy nie stosować leku Ascalcin plus:

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników leku
- W przypadku czynnej choroby wrzodowej żołądka, dwunastnicy, stanów zapalnych przewodu pokarmowego
- W przypadku skazy krwotocznej, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowania leków przeciwzakrzepowych
- W przypadku zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
- Jeśli u pacjenta występuje znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi.
- Jeśli u pacjenta występuje astma współistniejąca z polipami nosa
- W ciężkiej niewydolności nerek, wątroby, serca
- W okresie ciąży i karmienia piersią
- U pacjentów chorych na fenylketonurię
- U dzieci do lat 12 w przebiegu ospy wietrznej i grypy.

Przeciwwskazania - Ascalcin Plus Cytryna, 10 saszetek

- zaburzenia czynności żołądka i jelit: nudności, bóle brzucha, zaostrzenie choroby wrzodowej, nadżerki błony śluzowej i krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów oraz smolistych stolców,
- zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, szum w uszach, pocenie się,
- zaburzenia krwi: zaburzenia krzepnięcia, zwiększone krwawienie miesiączkowe,
- zaburzenia układu immunologicznego: zmiany skórne, rumień, duszność, pokrzywka, napad astmy oskrzelowej, duszność.

W związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na leki z grupy salicylanów i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, astmę oskrzelową, czynną chorobę wrzodową, zaburzenia krzepnięcia krwi, polipy nosa, małą liczbę płytek krwi, Gdy przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, leki obniżające ciśnienie krwi, doustne leki przeciwcukrzycowe, preparat zawierający metotreksat, stosujesz wkładki wewnątrzmaciczne. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.