

Ascofer, 50 drażetek



Nasza cena: 13,48 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	DRAŻ.
Producent	ESPEFA S.P.CH-F.KRAKÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	FERRUM

Opis produktu

Opis

Ascofer, 50 drażetek

Tabletki drażowane Ascofer zawierają 200 mg żelaza (II) glukonianu i służą do uzupełniania niedoborów żelaza.

Dawkowanie

Leczniczo – dorośli: zwykle 2 tabletki drażowane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku, a w znacznych niedoborach 2 tabletki drażowane 4 razy na dobę,

Leczniczo – dzieci w wieku powyżej lat 3: leczniczo 4 – 6 mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.

Zapobiegawczo – dorośli: około 60 mg żelaza (3 tabletki drażowane) na dobę w dawkach podzielonych,

Zapobiegawczo – dzieci: 2 mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.

Uzyskanie pełnego efektu leczniczego wymaga regularnego i długotrwałego stosowania.

Skład

(1 tabletki):

Rdzeń tabletki zawiera substancję czynną: żelaza (II) glukonian 200 mg (co odpowiada 23,2 mg żelaza) oraz substancje pomocnicze: skrobię ziemniaczaną, talk, kwas askorbowy, glikol propylenowy, kwas stearynowy.

Otoczka zawiera: talk, sacharozę, żelatynę, magnezu tlenek, gumę arabską, czerwień koszenilową.

Działanie

Niedobory żelaza mogą poważnie zaburzyć wytwarzanie czerwonych krwinek i oddychanie tkanek, poprzez zmniejszenie ilości białek przenoszących i zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina).

Wskazania

- stany niedoboru żelaza związane z utratą krwi;
- zwiększenie zapotrzebowania organizmu (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu, w czasie ciąży i karmienia piersią);
- stany związane z zaburzeniami wchłaniania lub z dietą zawierającą za mało żelaza.

Przeciwwskazania

Leku Ascofer nie należy stosować w przypadku:

- chorób krwi: hemosyderozy, hemochromatozy (marskości barwnikowej cechującej się wzmożonym wchłanianiem oraz nadmiernym odkładaniem się żelaza w narządach wewnętrznych), niedokrwistości - - - - hemolitycznej i aplastycznej, chorób rozrostowych;
- marskości wątroby;
- nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Możliwe działania nieporządane

Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe: biegunki, zaparcia, nudności, wymioty, zgaga, bóle w nadbrzuszu. W takich przypadkach wskazane jest zmniejszenie dawki.

Interakcje

Wchłanianie żelaza zmniejszają środki zobojętniające sok żołądkowy, niektóre antybiotyki (np. pochodne tetracykliny, neomycyna, chloramfenikol, pochodne fluorochinolonu (jak cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna), cholestyramina, sole wapnia i bizmutu, wyciągi z trzustki.

Wchłanianie żelaza zwiększa się w obecności kwasu askorbowego (witaminy C).

Podawane doustnie związki żelaza osłabiają działanie metylodopy, lewodopy, penicylaminy i tyroksyny (nasilają objawy niedoczynności tarczycy).

Należy zachować przynajmniej 2 godziny odstępu pomiędzy podaniem leku Ascofer i innych leków doustnych.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność kierowców ani osób obsługujących maszyny w ruchu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.