


Ascorvita (Addit.zitron Vit.c), 10 tabletek musujących

Nasza cena: 7,92 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	TABL.MUS.
Producent	N.P.PHARMA OSTRÓW MAZOWIECKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM ASCORBICUM

Opis produktu

Opis

Ascorvita (Addit.zitron Vit.c), 10 tabletek musujących

Preparat polecany w stanach niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C.

Dawkowanie - Ascorvita (Addit.zitron Vit.c)

Dorośli 1 raz dziennie po 1 tabletkę rozpuszczonej w 1/2 szklanki wody lub soku.
Lek nie zawiera cukru, dlatego może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Składniki - Ascorvita (Addit.zitron Vit.c)

1 tabletkę zawiera substancję czynną kwas askorbinowy 1000 mg.
Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sorbiol, skrobia kukurydziana, aromat cytrynowy, aspartam, ryboflawiny fosforan sodowy (barwnik).

Działania

Kwas askorbinowy bierze udział w licznych procesach metabolicznych, pełni ważną rolę w procesach oksydoredukujących ułatwiając m.in. wchłanianie żelaza, bierze udział w syntezie hemoglobiny, jest niezbędny do tworzenia kolagenu i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstek, kości i zębów. Witamina C uczestniczy w procesie gojenia ran, utrzymuje mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych, wykazuje właściwości antyoksydacyjne i zwiększa odporność organizmu.

Przeciwwskazania - Ascorvita (Addit.zitron Vit.c)

Nie stosować leku Additiva Witamina C::

- u dzieci do 12 roku życia
- jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na składniki preparatu

Przeciwwskazania - Ascorvita (Addit.zitron Vit.c)

Jak każdy lek, Additiva Witamina C o smaku cytrynowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Kwas askorbowy jest metabolizowany częściowo do kwasu szczawowego i jego wysokie stężenia mogą doprowadzić do krystalizacji szczawianów; zakwaszenie moczu może być również przyczyną krystalizacji moczanów czy cytrynianów i w efekcie kamicy dróg moczowych.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.