

Asmag, 50 tabletek



Nasza cena: 13,06 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	FARMAPOL-POZNAN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	MAGNESIUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w celu uzupełnienia niedoboru magnezu.

Dawkowanie - Asmag, 50 tabletek

Dorośli - doustnie, po 3 tabletki 4 razy na dobę, po posiłku, popijając wodą. Dzieci - doustnie, po 1 tabletkę 2 do 3 razy na dobę, po posiłku, popijając wodą.

Składniki - Asmag, 50 tabletek

1 tabletkę zawiera:

300 mg Magnezii hydroaspartas (magnezu wodorooasparagianu czterowodnego), co odpowiada 20 mg jonów magnezu.

Substancje pomocnicze: laktoza, skrobia ziemniaczana, dekstryna, metyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.

Działania

Magnez jest jednym z podstawowych składników budulcowych organizmu. Jest składnikiem lub uczestniczy w działaniu enzymów regulujących przemianę węglowodanów, białek i tłuszczów, oraz procesy wytwarzania i magazynowania energii.

Niedobór magnezu osłabia odporność immunologiczną, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, mięśni i tkanki kostnej, oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

Przeciwwskazania - Asmag, 50 tabletek

Nie należy stosować leku Asmag, jeśli występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, hipermagnezemia (nadmiar magnezu we krwi), ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia (zbyt wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni), biegunka.

Leku nie podaje się podczas leczenia antybiotykami.

Przeciwwskazania - Asmag, 50 tabletek

Jak każdy lek, Asmag może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych. Większe dawki związków magnezu mogą powodować wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, wymioty, biegunka).

Uwagi

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Podawanie jednocześnie z antybiotykami z grupy tetracyklin, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi hydroksykumaryny, a także lekami zawierającymi fosforany, związki wapnia i żelaza prowadzi do wzajemnego zmniejszenia wchłaniania z przewodu pokarmowego.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.