

## Asmag B, 50 tabletek



Nasza cena: 14,20 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	FARMAPOL-POZNAN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	MAGNESIUM, PYRIDOXINUM

### Opis produktu

#### Opis

Preparat stosowany w celu uzupełnienia niedoborów magnezu.

#### Dawkowanie - Asmag B, 50 tabletek

Dorośli - doustnie po 3 tabletki 4 razy na dobę, po posiłku, popijając wodą,  
Dzieci - doustnie po 1 tabletkę 2 do 3 razy na dobę, po posiłku, popijając wodą.

#### Składniki - Asmag B, 50 tabletek

##### 1 tabletkę zawiera:

300 mg Magnezii hydroaspartas (magnezu wodorooasparagianianu czterowodnego), co odpowiada 20 mg jonów magnezu;  
0,25 mg Pyridoxini hydrochloridum (pirydoksyny chlorowodoru).  
Substancje pomocnicze: laktoza, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa, metylceluloza, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna.

#### Działania

Magnez jest jednym z podstawowych składników budulcowych organizmu. Jest składnikiem lub uczestniczy w działaniu enzymów regulujących przemianę węglowodanów, białek i tłuszczów, a także w procesach wytwarzania i magazynowania energii. Niedobór magnezu osłabia odporność immunologiczną, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, mięśni i tkanki kostnej oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

Jednoczesne podawanie magnezu i pirydoksyny (witaminy B6) sprawia, iż wchłanianie magnezu ulega zwiększeniu. Pirydoksyna ułatwia

także wychwytywanie magnezu przez komórki.

W ustroju istnieją ściśle powiązania między witaminą B6 a magnezem. Tworzenie złożonych związków magnezu z witaminą B6 umożliwia czynny transport i przedłuża czas przebywania magnezu w organizmie. Pirydoksyna zwiększa też stężenie magnezu w osoczu i erytrocytach oraz zmniejsza jego wydalanie z moczem.

## Wskazania - Asmag B, 50 tabletek

Niedobór magnezu.

## Przeciwwskazania - Asmag B, 50 tabletek

Nie należy stosować leku Asmag B, jeśli występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, hipermagnezemia (nadmiar magnezu we krwi), ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), biegunka, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia (zbyt wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni).

Leku nie podaje się podczas antybiotykoterapii.

Jak każdy lek, Asmag B może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych. Większe dawki związków magnezu mogą powodować wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, wymioty, biegunka).

## Uwagi

- Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

- Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

- Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Podawanie jednocześnie z antybiotykami z grupy tetracyklin, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi hydroksykumaryny, a także lekami zawierającymi fosforany, związki wapnia i żelaza, prowadzi do wzajemnego zmniejszania wchłaniania z przewodu pokarmowego.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**