

Aspafar Farmapol (Asparaginian Med), 50 tabletek



Nasza cena: 7,12 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	FARMAPOL-POZNAN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	MAGNESIUM, KALII HYDROGENOASPARTAS

Opis produktu

Opis

Aspafar Farmapol jest lekiem dostarczającym magnez i potas.

Dawkowanie - Aspafar Farmapol, 50 tabletek

ASPAFAR FARMAPOL należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku, to: - dorośli: doustnie, 1 do 3 tabletek dwa razy na dobę, co oznacza, że nie więcej niż 6 tabletek na dobę.

Zaleca się stosować lek rano i wieczorem po posiłku, popijając wodą.

Składniki - Aspafar Farmapol, 50 tabletek

(1 tabletki):

250 mg Magnezu hydroaspartas (magnezu wodorooasparaginianu czterowodnego), co odpowiada 17 mg jonów magnezu;
250 mg Kalii hydroaspartas (potasu wodorooasparaginianu półwodnego), co odpowiada 54 mg jonów potasu.

Substancje pomocnicze:

skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, celuloza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Działania

Magnez jest jednym z podstawowych składników budulcowych organizmu. Jest składnikiem lub uczestniczy w działaniu enzymów regulujących przemianę węglowodanów, białek i tłuszczów, oraz w procesach wytwarzania i magazynowania energii. Niedobór magnezu osłabia odporność immunologiczną, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, mięśni i tkanki kostnej, oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

Potas wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego oraz aktywność mięśnia sercowego. Jest ważnym składnikiem cytoplazmy, jest niezbędny do syntezy białek w rybosomach, zmniejsza pęcznienie komórek i zwiększa przepuszczalność błon komórkowych.

Wskazania - Aspafar Farmapol, 50 tabletek

Niedobory magnezu i potasu, stany przemęczenia, w rekonwalescencji po chorobach zakaźnych i zabiegach chirurgicznych, w zaburzeniach snu i koncentracji.

Przeciwwskazania - Aspafar Farmapol, 50 tabletek

Nie należy stosować leku jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, ciężka niewydolność nerek, zakażenia dróg moczowych, hiperkaliemia, hipermagnezemia, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

Możliwe jest wystąpienie hiperkaliemii z zaburzeniami rytmu serca (zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek), dolegliwości żołądkowo-jelitowych (nudności, wymioty, biegunka), uczucie metalicznego smaku.

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy cierpisz na zaburzenia czynności nerek. Gdy przyjmujesz antybiotyki.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.