


Aspicont (Acticard) tabletki dojelitowe 75mg x 60



Nasza cena: 6,33 zł

Opis słownikowy

Dawka	75 MG
Opakowanie	*60
Postać	TABL.DOJELIT.
Producent	Vitama Polska [PI]
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Lek Aspicont zawiera kwas acetylosalicylowy, który stosowany w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwplatek. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w procesie zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka sytuacja wystąpi w sercu, może to spowodować zawał serca lub dławicę piersiową, a w mózgu może wywołać udar.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

1 -2 tabletki (75-150mg) na dobę.

W zapobieganiu udarom mózgu zalecana dawka to 1 –4 tabletki (75-300 mg) na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować w trakcie lub po posiłku -połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody (pół szklanki). Tabletka dojelitowa leku Aspicont ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Leku Aspicont nie podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że jest to zalecone przez lekarza.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Lek Aspicont należy stosować z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej skłonni do występowania działań niepożądanych. Jeśli nie występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby, zalecana jest dawka zwykle stosowana u pacjentów dorosłych.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.