

Aspirin Cardio tabletki dojelitowe 0,1 g (Import równoległy), 30 sztuk

IMPORT

Nasza cena: 8,62 zł

Opis słownikowy

Dawka	100 MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

Opis produktu

Opis

Aspirin Cardio tabletki dojelitowe 0,1 g (Import równoległy), 30 sztuk

Wskazania

Choroby układu sercowo - naczyniowego: niestabilna choroba wieńcowa, świeży zawał mięśnia sercowego lub podejrzenie świeżego zawału serca, zapobieganie powtórnemu zawałowi serca, zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencjach na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa - PTCA, pomostowanie aortalno-wieńcowe - CABG, endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie "shunt" tętniczo-żylny), zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia - TIA i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, zapobieganie pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych, jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

Działanie

Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Nieodwracalnie hamuje cyklooksyzgenazę kwasu arachidonowego, a tym samym hamuje syntezę prostaglanoidów, w tym A2 - co hamuje agregację płytek krwi. Efekt hamujący utrzymuje się do czasu pojawienia się nowej generacji płytkowej. Otoczka tabletki, oporna na działanie soku żołądkowego, zapewnia uwalnianie leku dopiero w jelicie cienkim. Lek szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest przekształcany do czynnego metabolitu, kwasu salicylowego, w czasie i po wchłonięciu. Maksymalne stężenie kwasu acetylosalicylowego pojawia się po 10-20 min, a kwasu salicylowego po 0,3-2 h. Silnie wiąże się z białkami osocza, przenika przez łożysko i do mleka matki. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie przez nerki. T_{0,5} wynosi 2-3 h.

Sposób użycia

Doustnie. Niestabilna choroba wieńcowa: 100 mg raz na dobę. Świeży zawał serca lub jego podejrzenie: początkowa dawka nasycająca wynosi 200-300 mg raz na dobę; pierwszą tabl. należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie. Zapobieganie powtórnemu zawałowi serca: 100 mg raz na dobę. Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencjach na naczyniach: 100 mg raz na dobę. Zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA: 100 mg raz na dobę. Zapobieganie pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka: 100 mg raz na dobę. Zapobieganie zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych: 100-200 mg raz na dobę. Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.