

# Aspirin Complex, granulat do zawiesiny doustnej, 10 saszetek



Nasza cena: 24,94 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*10 sasz.
Postać	GRAN.D/ZAW.
Producent	Bayer
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Psychotrop

## Opis produktu

### Opis

Preparat jest stosowany w leczeniu objawowym kataru, gorączki i bólu związanych z przeziębieniem.

### Dawkowanie - Aspirin Complex, granulat do zawiesiny doustnej, 10 saszetek

Dorośli 1-2 saszetki w dawce pojedynczej. Całkowita dawka dobowa - do 6 saszetek. Leku nie należy podawać dzieciom poniżej 16 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej.

### Składniki - Aspirin Complex, granulat do zawiesiny doustnej, 10 saszetek

kwasy acetylosalicylowy 500 mg, chlorowodorek pseudoefedryny 30 mg. Inne składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sacharoza, hypromeloza, sacharyna, aromat pomarańczowy (zawiera alkohol benzylowy, alfa-tokopherol, skrobię modyfikowaną, maltodekstrynę).

### Działania

Lek Aspirin Complex ma właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i zmniejszające obrzęk błony śluzowej nosa.

### Przeciwwskazania - Aspirin Complex, granulat do zawiesiny doustnej, 10 saszetek

- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- uczulenie na salicylany,
- choroba wrzodowa żołądka,
- skłonność do krwawień,
- ciąża lub karmienie piersią,
- niewydolność wątroby lub nerek,
- ciężka, niestabilna niewydolność serca,
- przyjmowanie metotreksatu 15 mg na tydzień lub większa,
- bardzo wysokie ciśnienie krwi lub ciężka choroba wieńcowa,
- równoczesne przyjmowanie inhibitorów monoaminoksydazy.

## Przeciwwskazania - Aspirin Complex, granulat do zawiesiny doustnej, 10 saszetek

Działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego:

- wrzody trawienne,
- krwawienia z przewodu pokarmowego,
- reakcje uczuleniowe,
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Działania niepożądane pseudoefedryny:

- objawy niepożądane ze strony serca,
- zatrzymanie moczu,
- podwyższenie ciśnienia krwi,
- bezsenność, halucynacje.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**