

Atoris 30 mg 30 tabletek

Nasza cena: 10,17 zł

Opis słownikowy

Dawka	30MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	KRKA PHARM.D.D. NOVO MESTO SŁOWENIA [SI]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	ATORVASTATINUM

Opis produktu

Opis

Atoris 30 mg, 30 tabletek

Wskazania:

- lek stosuje się w przypadku leczenia hipercholesterolemii.
- w celu obniżenia stężenia całkowitego cholesterolu

Dawkowanie:

Lekarz dawkę ustala indywidualnie w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną
- nadwrażliwość na substancję uzupełniającą
- choroby wątroby
- choroby mięśni szkieletowych
- ciąża i karmienie piersią

Działania niepożądane:

W większości przypadków są łagodne i przemijające. W badaniach klinicznych mniej niż 2% pacjentów musiało odstawić lek z powodu działań niepożądanych. Najczęściej występują zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, biegunka), bóle głowy, bóle mięśni i zaburzenia snu. Częstość występowania znamienego zwiększenia aktywności aminotransferaz

(A1AT, AspAT) jest prawdopodobnie związana z dawką, ponieważ występowało ono najczęściej u pacjentów, którzy zażywali 80 mg atorwastatyny. Mniej niż 0,3% pacjentów musiało z tego powodu odstawić lek. Miopatia objawiająca się bólami mięśni, ich osłabieniem i zwiększeniem aktywności mięśniowej frakcji kinazy kreatynowej (CK) występuje sporadycznie. W pojedynczych przypadkach rozwija się rabdomioliza, która może doprowadzić do ostrej niewydolności nerek. Pozostałe działania niepożądane, które występują sporadycznie lub zostały opisane w pojedynczych przypadkach to: brak apetytu, wymioty, dezorientacja, parestezje, neuropatia obwodowa, kurcze mięśni, zapalenie mięśni, zapalenie skórno-mięśniowe, martwica rozplywna naskórka, wysypka skórna, świąd, łysienie, żółtaczką, zastój żółci, zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, zapalenie gardła, nieżyt nosa, bóle w klatce piersiowej, małopłytkowość, hipoglikemia lub hiperglikemia, zaburzenia erekcji i reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, wysypka skórna, bóle stawów).

Działanie:

- zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego
- zmniejsza stężenie trójglicerydów
- zwiększa poziom dobrego cholesterolu
- zmniejsza poziom złego cholesterolu

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 30 mg atorwastatyny.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.