

Atrox 20 30 tabletek 20 mg

Nasza cena: 9,11 zł

Opis słownikowy

Dawka	20MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	ATORVASTATINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego,
- u pacjentów z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej,
- u pacjentów dorosłych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże.

Dawkowanie:

Sposób użycia leku jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta w zależności od tego na jaką dolegliwość jest on leczony.

Zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę.

Działanie:

Atorwastatyna jest selektywnym, kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA - enzymu ograniczającego szybkość syntezy cholesterolu, katalizującego przemianę 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A do mewalonianu będącego prekursorem steroli, w tym cholesterolu. W wątrobie triglicerydy i cholesterol są wbudowywane w lipoproteiny bardzo niskiej gęstości (VLDL) i przenoszone w osoczu do tkanek obwodowych. Powstające z VLDL lipoproteiny niskiej gęstości (LDL), są katabolizowane głównie za pośrednictwem receptorów o wysokim powinowactwie do LDL (receptorów LDL).

Skład:

1 tabletkę powlekaną zawiera 20 mg atorwastatyny.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjenta występują dolegliwości związane:

- z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnioną,
- z trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy przekraczającą trzykrotnie górną granicę normy;
- w ciąży,
- podczas karmienia piersią
- u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Działania niepożądane:

- zapalenie błony śluzowej nosa i gardła,
- reakcje alergiczne,
- hiperglikemia,
- hiperglikemia,
- ból głowy,
- nieostre widzenie,
- bóle gardła i krtani,
- krwawienie z nosa,
- zaparcia,
- wzdęcia,
- niestrawność,
- nudności,
- biegunka,
- bóle mięśni,
- bóle stawów,
- bóle kończyn,
- skurcze mięśni,
- obrzęk stawów,
- ból pleców.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania a także skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.