

Avenalax Czopki glicerolowe, 1g, 10 szt.



Nasza cena: 6,57 zł

Opis słownikowy

Dawka	1G
Opakowanie	*10
Producent	AVENA BYDGOSZCZ LAB.FARM. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	GLYCEROLI SUPPOSITORIA

Opis produktu

Opis

Czopki glicerolowe czopki 1 g / lek OTC

Skład:

glicerol 86%, bezwodny węglan sodu, kwas stearynowy.

Wskazania:

w zaparciach jako środek delikatnie przeczyszczający.

Przeciwwskazania:

Czopków glicerolowych nie można używać w chorobach nowotworowych odbytnicy, przy ostrej niewydolności nerek, zapaleniu wyrostka robaczkowego i innych stanach zapalnych w obrębie jamy brzusznej.

Działania niepożądane:

Na ogół dobrze tolerowane, mogą powodować podrażnienia odbytnicy.

Avenalax a inne leki:

Mogą osłabić działanie innych, jednocześnie stosowanych doodbytniczo leków. Należy zachować kilkugodzinny odstęp w stosowaniu.

Dawkowanie:

Stosować doraźnie.

Czopki 1 g: Dzieci poniżej 1 roku życia czopki należy stosować po konsultacji z lekarzem. Dzieci w wieku 1-3 lat: stosować doodbytniczo, na noc jednorazowo ½ czopka krojonego wzdłuż. Dzieci w wieku 3-6 lat: jednorazowo 1 do 2 czopków, na noc. Efekt przeczyszczający następuje po 15-60 minutach od zastosowania. Przed zastosowaniem czopek należy wyjąć z opakowania polietylenowego.

Czopki 2 g: Dzieci w wieku 6-12 lat i dorośli: jednorazowo 1-2 czopki, na noc. Wypróżnienie powinno nastąpić po 15-60 minutach od zastosowania. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 roku życia, z uwagi na możliwość zastosowania czopków glicerolowych 1 g. Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania czopka utrzymuje się zaparcie – należy wtedy skonsultować się z lekarzem.

Mechanizm działania: Za działanie przeczyszczające czopków odpowiada osmotycznie czynny glicerol oraz mydło stearynowe, działające poprzez miejscowe podrażnienie jelit, zwiększając perystaltykę i ułatwiając wypróżnienie.

Podmiot odpowiedzialny: Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44, 30-721 Kraków.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.