

## Avilin Gastro, płyn 110 ml



Nasza cena: 40,20 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	110 ml
Postać	PLYN
Producent	NES PHARMA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

### Avilin Gastro, płyn 110 ml

Avilin Gastro 110 ml to wyrób medyczny w postaci płynu do użytku wewnętrznego, stosowany w charakterze opatrunku adhezyjnego przy różnorodnych dolegliwościach żołądkowych: refluksie (również nadżerkowym), zgadze, nadkwaśności i nieżyty żołądka, a także chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy.

Płyn jest odporny na środowisko układu pokarmowego, nie ulega więc degradacji i skutecznie zabezpiecza błony śluzowe na długo. Wysoka lepkość preparatu sprawia, że utrzymuje się on na błonach śluzowych, co skutecznie chroni je przed uszkodzeniem. Dzięki właściwościom hydrofobowym płyn przylega głównie do miejsc, gdzie występują ubytki w barierze śluzowej. Właściwości fizykochemiczne wyrobu medycznego Avilin Gastro (110 ml) pomagają stworzyć w przewodzie pokarmowym środowisko odpowiednie do zajścia naturalnych procesów gojenia i odbudowy tkanek błony śluzowej.

### Skład

Polimer E (eter poliwinyllobutylowy).

### Wskazania

Płyn Avilin Gastro (110 ml) stosuje się w dolegliwościach związanych z refluksem, również w postaci nadżerkowej, zgagą, nadkwaśnością lub nieżytem żołądka, a także chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

### Dawkowanie Avilin Gastro, płyn 110 ml

Zażyj 15 ml (łyżkę stołową) płynu Avilin Gastro wieczorem (na pusty żołądek, idealnie po ok. 5 godzinach po ostatnim posiłku).

Stosuj codziennie, maksymalnie do 28 dni.

## Przeciwwskazania Avilin Gastro, płyn 110 ml

Uczulenie na składniki preparatu.

Podczas ciąży i karmienia piersią przed zażyciem wyrobu medycznego Avilin Gastro należy skonsultować z lekarzem.

### Ważne

- Ze względu na jego lepkość, nie należy stosować preparatu Avilin Gastro w przypadku chorób wątroby (zapalenia pęcherzyka żółciowego i/lub uszkodzenia miąższu wątroby).
- Nie stosować wyrobu medycznego u dzieci poniżej 12 roku życia.
- Nie stosować dłużej niż 28 dni. Jeżeli konieczne jest kontynuowanie stosowania płynu Avilin Gastro, nieodzowna jest kilkudniowa przerwa.
- Nie należy aplikować płynu Avilin Gastro do oczu.
- Nie należy stosować płynu po upływie terminu przydatności.
- Nie należy używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone lub rozszczelnione.

Należy używać preparatu Avilin Gastro wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Jeśli dolegliwości utrzymują się dłużej niż 28 dni lub nasilają się mimo stosowania Avilinu Gastro, powinno skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z ulotką i instrukcją.

## Przechowywanie Avilin Gastro, płyn 110 ml

Preparat należy przechowywać w temperaturze od -5°C do +50°C.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**