

Aviomarin, tabletki, 10 sztuk



Nasza cena: 28,53 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DIMENHYDRINATUM

Opis produktu

Opis

Lek stosuje się w zapobieganiu m.in chorobie lokomocyjnej

Wskazania:

Lek stosuje się w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów innego pochodzenia (z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów).

Działanie:

Dimenhydramina (synonim: dimenhydrinat) działa przeciwwymiotnie, przeciwuczuleniowo i łagodnie uspokajająco. Początek działania występuje po 20 do 30 minutach. Efekty kliniczne obserwowane są przez 4 do 6 godzin po podaniu leku.

Działanie niepożądane:

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą senność, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy.

Często występują niepokój, zaburzenia widzenia (przemijające upośledzenie widzenia w ciemności i widzenia kolorów), wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą, nudności, wymioty, biegunka (w przypadku uczulenia na dimenhydraminę), zaparcia, bóle brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, uczucie osłabienia i zmęczenia.

Rzadko odnotowano przyspieszenie akcji serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi, niedokrwistość hemolityczną, bóle głowy, bezsenność, skórne reakcje alergiczne, nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, złuszczone zapalenie skóry, zmniejszenie łaknienia, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczkę cholestatyczną.

Długotrwałe stosowanie dimenhydraminy może prowadzić do zależności lekowej.

U dzieci mogą wystąpić reakcje paradoksalne na dimenhydraminę (np. niepokój, rozdrażnienie).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Dawkowanie:

profilaktycznie - przynajmniej na 30 minut przed planowaną podróżą lub zażyciem źle tolerowanego leku:

- dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia: 1 do 2 tabletek),

- dzieci 5 - 14 lat: 1/2 do 1 tabletki

W razie konieczności dawkę można powtórzyć.

Nudności i wymioty:

- dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia: 1 do 2 tabletek, jeśli potrzeba co 4 do 6 godzin, nie więcej niż 400 mg na dobę,

- dzieci 5 – 14 lat: 1/2 do 1 tabletki, jeśli potrzeba co 6 do 8 godzin, nie więcej niż 150 mg na dobę.

Składnik:

Substancją czynną leku jest dimenhydramina.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.