

Aviorexan 50 mg + 50 mg, 10 tabletek powlekanych

Nasza cena: 16,24 zł



Opis słownikowy

Dawka	50MG+50MG
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DIMENHYDRINATUM, COFFEINUM

Opis produktu

OPIS

Opis

Aviorexan to złożony lek, który zawiera dwie substancje czynne: *dimenhydraminę* i *kofeinę*.

Dimenhydramina należy do grupy leków przeciwhistaminowych.

Kofeina działa pobudzająco na układ nerwowy oraz łagodzi działanie uspokajające dimenhydraminy.

Obie substancje wpływają na zmniejszenie objawów w przebiegu choroby lokomocyjnej.

Początek działania występuje po 15 – 30 minutach. Efekty lecznicze obserwowane są przez 3 do 6 godzin po podaniu leku.

Wskazania do stosowania

Aviorexan jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu objawów w przebiegu choroby lokomocyjnej takich jak: nudności, wymioty i zawroty głowy.

Skład leku Aviorexan

Substancja czynna: *Coffeinum*, *Dimenhydrinatum*

Substancją czynną leku są dimenhydramina i kofeina. Każda tabletki powlekana zawiera 50 mg dimenhydraminy (*Dimenhydrinatum*) i 50 mg kofeiny (*Coffeinum*).

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna, krospowidon Typ A, powidon K 29/32, krzemionka koloidalna

bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dawka wynosi 1-2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę. W profilaktyce objawów choroby lokomocyjnej pierwszą dawkę należy zażyć nie później niż 30 minut przed planowaną podróżą.

Podanie doustne. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą lub mlekiem.

Aviorexan u dzieci i młodzieży

Aviorexan nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania

jeśli pacjent ma uczulenie na dimenhydraminę, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

jeśli u pacjenta występują:

- porfiria,
- ostry atak astmy,
- ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe,
- niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
- bezsenność i stany lękowe,
- padaczka,
- wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy,
- ciężkie zaburzenia wątroby,
- jaskra z wąskim kątem przesączania,
- guz chromochłonny nadnerczy.

Zawartość:

10 tabletek powlekanych

Sposób przechowywania

15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny

BIOFARM

Pozwolenie: MZ 26702

Ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aviorexan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z nadwrażliwością na inne leki przeciwhistaminowe, ponieważ może wystąpić reakcja krzyżowa.

Należy zachować ostrożność, u pacjentów:

z nadwrażliwością na leki stosowane w łagodzeniu alergii (leki przeciwhistaminowe) lub leki z grupy pochodnych ksantyny (m.in. teofilina i aminofilina stosowane w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc),
z rozrostem gruczołu krokowego,
z trudnościami w oddawaniu moczu,
ze zwężającym wrzodem trawiennym lub zwężeniem odźwiernika,
z nadczynnością tarczycy,
z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania,
z chorobami oskrzeli i (lub) płuc: przewlekłym zapaleniem oskrzeli, astmą oskrzelową, obturacyjną chorobą płuc, rozedmą płuc,
z zaburzeniami rytmu serca,
z chorobą niedokrwienną serca,
z cukrzycą.

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych spowodowanych przez dimenhydraminę.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby.

Aviorexan a ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Aviorexan w trzecim trymestrze ciąży.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży, a także w trakcie karmienia piersią lek można stosować tylko, gdy w opinii lekarza korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Lek przenika do mleka kobiecego, należy stosować go ostrożnie, tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści dla matki do ryzyka dla karmionego dziecka.

Aviorexan a prowadzenie pojazdów

Dimenhydramina ogranicza sprawność psychofizyczną, dlatego nie należy jej stosować u osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.

Aviorexan - przedawkowanie

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Aviorexan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Aviorexan nie należy stosować w poniższych lekami:

barbiturany (leki często stosowane jako środki uspokajające), środki uspokajające i kojące (leki stosowane w leczeniu napięcia nerwowego, depresji i lęków), atropina (lek zwiotczający mięśnie, często stosowany podczas badań okulistycznych) - równoczesne stosowanie może powodować uczucie zmęczenia lub senność;
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji i lęków) – lek Aviorexan może nasilać ich działanie;
leki o działaniu fotouczulającym (leki zwiększające wrażliwość skóry na słońce i powodujące reakcje alergiczne w wyniku ekspozycji na słońce) – lek Aviorexan może nasilać ich działanie;
aminoglikozydy (rodzaj antybiotyków) – mogą one uszkadzać ucho wewnętrzne, a podczas stosowania leku Aviorexan takie uszkodzenie może być maskowane;
disulfiram (stosowany w leczeniu choroby alkoholowej) – kofeina może powodować nasilenie zespołu odstawienia alkoholu;

inhibitory MAO (stosowane w leczeniu depresji) – równoczesne stosowanie może powodować wzrost ciśnienia tętniczego i przyspieszenie rytmu serca (tachykardię);
lit (stosowany w leczeniu zaburzenia dwubiegunowego) – kofeina może nasilać wydalanie litu przez nerki;
teofilina (stosowana w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - kofeina może zmniejszać jej wydalanie.

Leki antykoncepcyjne spowalniają metabolizm kofeiny w wątrobie. Ponadto lek Aviorexan może zmieniać reakcje skórne na alergeny podczas testów skórnych. Nie należy stosować leku Aviorexan przynajmniej przez trzy dni przed planowanymi testami alergicznymi. Działania niepożądane leku Aviorexan

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia lekiem Aviorexan mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane związane ze stosowaniem dimenhydraminy:

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

niedokrwistość,
leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych),
trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek tj. białych, czerwonych i płytek krwi),
agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów lub brak granulocytów we krwi).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób)

paradoksalne pobudzenie (szczególnie u dzieci mogą wystąpić reakcje paradoksalne, takie jak bezsenność, nerwowość, zmieszanie, drgawki, drażliwość, euforię, delirium, kołatanie serca i drgawki),
tachykardia (przyspieszone bicie serca)*,
zaburzenia rytmu serca* (m.in. esktrasystolie – dodatkowe skurcze serca, blok serca),
zwiększenie ciśnienia tętniczego,
obniżenie ciśnienia tętniczego,
nasilenie wydzielania wydzieliny oskrzelowej mogące prowadzić do trudności w oddychaniu.

*reakcje zazwyczaj związane z przedawkowaniem dimenhydraminy

Częstość nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

reakcje anafilaktyczne,
reakcje alergiczne,
zmniejszenie apetytu,
pobudzenie,
zaburzenia snu,
niepokój,
drżenie,
senność,
uspokojenie (sedacja),
zawroty głowy,
ból głowy,
zaburzenia widzenia,
zwiększenie ciśnienia w oku,
nudności,
wymioty,
biegunka,
zaparcia,
ból brzucha,
suchość w ustach,
skórne reakcje alergiczne,
nadwrażliwość skóry na światło słoneczne,
zapalenie skóry,

świąd,
wysypka,
rumień,
trudności w oddawaniu moczu,
zaburzenia funkcji seksualnych,
nasilenie porfirii,
uczucie zmęczenia.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem kofeiny:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)

bezsennaś,
pobudzenie,
zwiększenie ciśnienia tętniczego,
obniżenie ciśnienia tętniczego.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób)

zmniejszenie poziomu glukozy we krwi,
zwiększenie poziomu glukozy we krwi,
niepokój (stosowanie dużych dawek może powodować nerwicę i lęk),
drażliwoś,
ból głowy,
szumy uszne,
uderzenia gorąca,
tachykardia (przyspieszone bicie serca),
zaburzenia rytmu serca,
kołatanie serca (nieprzyjemne uczucie nieregularnego i (lub) mocnego bicia serca),
przyspieszona częstoś^ć oddechów,
nudności,
wymioty,
biegunka,
ból brzucha,
częstomocz (konieczność oddawania moczu częś^ćiej niż zwykle).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.