

Azopt 1% 5 ml

Nasza cena: 10,14 zł

Opis słownikowy

Dawka	1%
Opakowanie	5 ml
Postać	KROPLE
Producent	ALCON-LABORATORIES WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	BRINZOLAMIDUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Preparat jest wskazany:

- do leczenia nadciśnienia ocznego,
- do leczenia jaskry z otwartym kątem przesączania w monoterapii u pacjentów dorosłych
- w leczeniu skojarzonym z β -blokerami lub analogami prostaglandyn.

Dawkowanie:

Dorośli: 2 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego, jednak niektórzy pacjenci mogą lepiej reagować, kiedy lek jest podawany 3 razy na dziennie.

Działanie:

Preparat należy do grupy inhibitorów anhidrazy węglanowej, IAW (ang. CAI). Anhidraza węglanowa, AW (ang. CA) jest enzymem obecnym w wielu tkankach organizmu (również w oku), katalizującym przebieg odwracalnej reakcji łączenia dwutlenku węgla z wodą i rozpadu kwasu węglowego. Brynzolamid jest inhibitorem izoenzymu CA przeważającego w oku (CA-II). Jego działanie polega na hamowaniu CA w wyrostkach ciała rzęskowego, w następstwie czego dochodzi do zmniejszenia produkcji cieczy wodnistej i tym samym - obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP). Przypuszczalny mechanizm działania polega na spowolnieniu wytwarzania jonów dwuwęglanowych i w następstwie tego zmniejszenie transportu sodu i płynów. Główną drogą eliminacji leku z ustroju jest wydalanie nerkowe.

Skład:

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg brynzolamidu.

Substancje pomocnicze:

- chlorek benzalkoniowy,
- tyloksapol,
- wersenian disodowy,
- chlorek sodu,
- kwas solny
- mannitol,
- karbomer 974P,
- wodorotlenek sodu (do ustalenia właściwego pH)
- woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu jeżeli u pacjentów występuje którakolwiek z poniższych dolegliwości:

- nadwrażliwość na brynzolamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
- nadwrażliwość na sulfonamidy,
- ciężkie upośledzenie czynności nerek,
- kwasica hiperchloremiczna.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane.

Do najczęstszych z nich należą:

- niewyraźne widzenie,
- uczucie dyskomfortu w oku (przejściowe pieczenie lub kłucie po zakropieniu),
- uczucie obecności ciała obcego w oku,
- przekrwienie oka,
- suchość, ból,
- świąd oka,
- obecność wydzieliny w oku,
- zapalenie rogówki,

- brzegów powiek lub spojówek,
- strupy na brzegach powiek,
- uczucie lepkości,
- łzawienie,
- zmęczenie oka,
- uszkodzenie rogówki,

W celu zapoznania się z innymi działaniami niepożądanymi mogącymi występować podczas stosowania leku należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania lub też skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub też farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.