

Azycyna 500 mg 3 tabletki powlekane

Nasza cena: 9,75 zł

Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*3
Postać	TABL.POWL.
Producent	POLFA PABIANICE POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	AZITHROMYCINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania

- Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę
- Zakażenia górnych dróg oddechowych
- Zapalenie ucha środkowego
- Zakażenia dolnych dróg oddechowych
- Zakażenia skóry i tkanek miękkich
- Choroby przenoszone drogą płciową
- Otolaryngologia

Dawkowanie

Lekarz dobiera dawkowanie indywidualnie do pacjenta.

Dorośli, młodzież i dzieci o masie ciała poniżej 45 kg zaleca się przyjmowanie 1 tabletki 500 mg raz na dobę.

Lek należy przyjmować doustnie godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
Tabletki nie należy dzielić.

Działanie

Lek Azycyna 500 mg działa bakteriostatyczne

Skład

1 tabletkę zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, erytromycynę lub inne antybiotyki z grupy makrolidów lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.