

## Baikadent, żel 15 g



Nasza cena: 15,92 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	15 g
Postać	ZEL
Producent	HERBAPOL-WROCŁAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SCUTELLARIA BAICALENSIS

### Opis produktu

#### Opis

### Baikadent, żel 15 g

Baikadent jest to żel do stosowania na dziąsła w chorobach przyzębia. Stosowanie preparatu poprawia stan dziąseł.

### Dawkowanie - Baikadent, żel 15 g

2-4 razy dziennie, bezpośrednio po umyciu zębów, ok. 2 cm żelu wcierać w miejsca chorobowo zmienione jamy ustnej i co najmniej 30 min nie jeść i nie pić.

W przewlekłych stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej, zaleca się systematyczne stosowanie preparatu przez okres 2 tygodni. Jeżeli po tym czasie objawy zapalne nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza.

### Składniki - Baikadent, żel 15 g

100 g żelu zawiera:

Substancja czynna  
Zespół flawonów izolowanych z korzenia *Scutellaria baicalensis* 0,577 g

Substancje pomocnicze  
Carbopol 5984, glicerol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, sodu węglan, woda oczyszczona.

### Działania

Przyjmuje się, że działanie przeciwzapalne oparte jest na hamowaniu syntezy komórkowych mediatorów stanów zapalnych (interleukiny IL-1 $\beta$ , leukotrienów, prostaglandyn) oraz na pobudzeniu aktywności fibroblastów w komórkach dziąseł. Ponadto zespół flawonów

charakteryzuje się aktywnością przeciwbakteryjną (głównie na bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus - gronkowiec złocisty, Staphylococcus mutans i inne patogenne bakterie np. Prevotella intermedia, dawniej Bacteroides melaninogenicus intermedius izolowane z jamy ustnej chorych cierpiących na przewlekłe stany zapalne śluzówki jamy ustnej) oraz przeciwgrzybicze (zwłaszcza na Candida albicans).

### Wskazania - Baikadent, żel 15 g

- w leczeniu uzupełniającym paradontopatii powierzchownych i głębokich
- w profilaktyce chorób przyzębia
- w przewlekłych stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej (również przy urazach spowodowanych przez protezy).

### Przeciwwskazania - Baikadent, żel 15 g

w przypadku uczulenia na pochodne kwasu benzoesowego lub na którykolwiek ze składników preparatu.  
Lek nie powinien być stosowany u dzieci.

### Przeciwwskazania - Baikadent, żel 15 g

Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych podczas stosowania leku BaikadentŻ, jednak w przypadku ich wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem.

### Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na nieznane ryzyko stosowania preparatu BaikadentŻ na dziąsła u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią, nie zaleca się stosowania.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**