

Bebiko 1 800g



Nasza cena: 45,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	800 g
Postać	PROSZ.
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu

Opis

Bebiko 1 to mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia.

W pierwszych miesiącach życia mleko jest jedynym pożywieniem Twojego dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczało wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju niemowlęcia.

Mleko matki jest najlepsze, ponieważ zostało stworzone przez naturę, aby dostarczać Twojemu dziecku wszystkiego, czego potrzebuje, w odpowiednich proporcjach. Z myślą o niemowlęciu, które nie może być karmione piersią, stworzyliśmy modyfikowane mleko początkowe w proszku – Bebiko 1.

Dawkowanie:

Wiek niemowlęcia: 1. miesiąc - Ilość porcji na dobę 7, Woda (ml) 90-120, Ilość płaskich miareczek na porcję 3-4

Wiek niemowlęcia 2.-3. miesiąc - Ilość porcji na dobę 6, Woda (ml), 120 Ilość płaskich miareczek na porcję 4

Wiek niemowlęcia 4. miesiąc Ilość porcji na dobę 6, Woda (ml) 150, Ilość płaskich miareczek na porcję 5

Wiek niemowlęcia 5.-6. miesiąc - Ilość porcji na dobę 4, Woda (ml), 180 Ilość płaskich miareczek na porcję 6

Wiek niemowlęcia 7. miesiąc Ilość porcji na dobę 3, Woda (ml) 210, Ilość płaskich miareczek na porcję 7

Sposób użycia:

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.

2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia.

3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.

4. Używaj wyłącznie załączonej miareczki. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Babilon Profutura 2.

5. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.

6. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.

7. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Ważne informacje Bebiko mleko początkowe powinno być wykorzystywane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy

używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.