

Bedicort G maść 15 g

Nasza cena: 20,76 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 g
Postać	MASC
Producent	JELFA S.A.JELEŃ GÓRA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	BETAMETHASONUM, GENTAMICINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Preparat jest zalecany do stosowania:

- w leczeniu sącących stanów zapalnych skóry,
- w atopowym zapaleniu skóry,
- w łojotokowym zapaleniu skóry,
- w liszaju prostym przewlekłym,
- w wyprysku rogowaciejącym,
- w łuszczycy,
- w alergicznym kontaktowym zapaleniu skóry,
- w skórnej postaci tocznia rumieniowatego,
- w rumieniu wielopostaciowym.

Dawkowanie:

- produkt przeznaczony jest do stosowania na skórę,
- należy nakładać niewielką ilość preparatu na zmienioną chorobowo skórę 1 do 2 razy dobowo,

- nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym,
- leczenia nie należy prowadzić bez przerwy dłużej niż 2 tygodnie,
- nie zaleca się stosowania produktu u dzieci w wieku do 12 lat.

Działanie:

- przeciwzapalne,
- przeciwświądowe,
- obkurczające naczynia krwionośne,
- przeciwbakteryjne.

Skład:

1 g maści zawiera 0,5 mg betametazonu w postaci betametazonu dipropionianu i 1 mg gentamycyny w postaci gentamycyny siarczanu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować:

- w nadwrażliwości na betametazonu dipropionian, gentamycynę na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,
- w wirusowych zakażeniach skóry (np. ospa wietrzna, opryszczka),
- w grzybiczych lub bakteryjnych (np. gruźlica) zakażeniach skóry,
- w nowotworach skóry,
- trądziku różowatym,
- w trądziku pospolitym,
- w zapaleniu lub owrzodzeniu żyłakowatym,
- na rozległe zmiany skórne,
- długotrwale,
- na skórę twarzy,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat,
- w okolicy odbytu i narządów płciowych,
- w zapaleniu skóry wokół ust,
- w zakażeniach skóry bakteriami opornymi na gentamycynę.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane:

- zmiany trądzikopodobne,

- plamica posteroïdowa,
- zahamowanie wzrostu naskórka,
- zaniki tkanki podskórnej,
- suchość skóry,
- odbarwienie lub przebarwienie skóry,
- zanik i rozstępy skóry,
- zapalenie mieszków włosowych,
- nadmierne owłosienie skóry,
- alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
- pokrzywka lub wysypka plamisto-grudkowa.

Należy zauważyć iż działania niepożądane mogą występować jedynie u części pacjentów, ich przebieg również może różnić się w zależności od pacjenta. Jeżeli u pacjenta pojawią się którekolwiek z działań niepożądanych opisanych w ulotce informacyjnej powinien on niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.