

# Bellergot 30 drażetek

Nasza cena: 17,17 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,3MG+0,1MG+0,02G
Opakowanie	*30
Postać	DRAZ.
Producent	HERBAPOL-WROCŁAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ERGOTAMINUM, ATROPINUM, PHENOBARBITALUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Lek stosowany jest w leczeniu wzmożonej pobudliwości nerwowej, które towarzyszą objawom menopauzy. Lek znajduje zastosowanie w migrenowych bólach głowy.

### Dawkowanie:

Dawkowanie leku ustalane jest indywidualnie przez lekarza na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz natężenia dolegliwości. Lek należy przyjmować tylko doraźnie w razie konieczności. Lek nie nadaje się do długotrwałych terapii. Nie wolno przekroczyć dawki 32 tabletek drażowanych w ciągu jednego tygodnia.

### Działanie:

Bellergot działa na organizm:

- uspokajająco
- nasennie
- przeciwmigrenowo
- rozkurczowo na mięśnie gładkie narządów wewnętrznych
- przeciwwymiotnie
- hamuje wydzielanie gruczołów

### Skład:

1 tabletkę preparatu zawiera:

- 0,3 mg ergotaminy winian
- 0,1 mg atropina w postaci zespołu alkaloidów tropanowych
- 20 mg fenobarbital

## Przeciwwskazania:

Nie wolno stosować preparatu jeśli występują ku temu przeciwwskazania, takie jak:

- nadwrażliwość na substancję czynną
- nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą
- porfiria
- miastenia
- obrzęk śluzowaty
- choroba Parkinsona
- niewydolność oddechowa
- astma
- rozedma płuc
- niewydolność serca
- niewydolność wątroby
- niewydolność nerek
- alkoholizm
- uzależnienie od leków
- ciąża i laktacja

## Działania niepożądane:

Wszystkie działania niepożądane znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania leku. Lista działań niepożądanych tworzona jest na podstawie zgłaszanych przez pacjentów objawów.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.