

Berimal Forte, 60 kapsułek

Nasza cena: 153,52 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	KAPS.
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

Berimal Forte to **suplement diety** przeznaczony dla osób dorosłych. Produkt zawiera wysoką zawartość polifenoli z bergamoty *Citrus bergamia* Risso w formie ActiBPF (ang. Bergamot - derived Polyphenolic Fraction).

Nie zawiera konserwantów.
Składnik ActiBPF jest w 100% naturalny.

SKŁADNIKI

ActiBPF sproszkowany sok z owoców bergamoty (*Citrus bergamia* Risso) standaryzowany na 38% zawartość BPF (ang. Bergamot - derived Polyphenolic Fraction); hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki roślinne); kwas L-askorbinowy; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

Składniki - zawartość w 1 kapsułce

ActiBPF - sproszkowany sok z owoców bergamoty standaryzowany na 38% polifenoli 500 mg
Witamina C 50 mg (62,5% RWS*)

Składniki - zawartość w 2 kapsułkach

ActiBPF - sproszkowany sok z owoców bergamoty standaryzowany na 38% polifenoli 1000 mg
Witamina C 100 mg (125% RWS*)

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

SPOSÓB UŻYCIA

Dorośli: 1-2 kapsułki dziennie przed posiłkiem.
Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Nie zaleca się wysypywania zawartości kapsułki do pożywienia.

OSTRZEŻENIA

Nie zaleca się stosować **w ciąży i w okresie karmienia piersią**.
W przypadku przyjmowania leków hipolipemizujących, stosowanie produktu należy skonsultować się z lekarzem.
BPF nie powoduje podwyższenia poziomu aminotrasferaz.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i wilgocią.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

USP Zdrowie Sp. z o. o.
ul Poleczki 35
02 822 Warszawa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.