

# Betadine antysepticoc sól 30ml (import równoległy)



Nasza cena: 12,97 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	POLYVIDONUM

## Opis produktu

### Opis

**Betadine** roztwór do stosowania na skórę jest środkiem dezynfekującym o szerokim spectrum działania przeciw drobnoustrojom (środkiem bakteriobójczym, grzybobójczym, selektywnie wirusobójczym i przeciwpierwotniakowym) przeznaczonym do dezynfekcji skóry przed iniekcją, pobraniem krwi, biopsją igłową, transfuzją, dezynfekcją skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi, aseptycznego zaopatrzenia ran, leczenia infekcji bakteryjnych i grzybiczych, całkowitej lub częściowej dezynfekcji pacjenta przed operacją ( kąpiel antyseptyczna)

### Dawkowanie:

Stosować w postaci gotowej lub w postaci roztworu wodnego w rozcieńczeniu, w zależności od wskazań terapeutycznych.

### Składniki:

1 ml roztworu zawiera 100 mg jodowanego powidonu, co odpowiada 10 mg aktywnego jodu oraz substancje pomocnicze: glicerol, nonoxynol 9, bezwodny kwas cytrynowy, bezwodny fosforan disodu, wodorotlenek sodu wodę oczyszczoną, jodan potasu.

### Działania:

Bakteriobójcze, grzybobójcze, selektywnie wirusobójcze i przeciwpierwotniakowe.

### Przeciwwskazania:

Uczulenie na jod lub inny składnik preparatu, rozpoznana nadczynność tarczycy lub innych chorób tarczycy, łagodny guz tarczycy, opryszczkowe zapalenie skóry, niewydolność nerek, przed i po leczeniu nadczynności tarczycy jodem radioaktywnym.

Zaburzenia nerek i pęcherza: zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki łącznej: miejscowe reakcje skórne, reakcje nadwrażliwości, jak kontaktowe zapalenie skóry objawiające się zmianami łuszczycopodobnymi, zaczerwienieniem, występowaniem małych pęcherzy.

Zaburzenia endokrynologiczne: długotrwałe stosowanie jodowanego powidonu może powodować zwiększoną absorpcję jodu. Może wystąpić nadczynność tarczycy, szczególnie u pacjentów ze współistniejącymi chorobami tarczycy.

## Uwagi:

Stosowanie preparatu po drugim miesiącu ciąży i w czasie karmienia piersią jest dozwolone jedynie w przypadku dokładnej diagnozy i bezwzględnych wskazań do zastosowania preparatu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**