

# Betadine, maść, 30 g (import równoległy)



Nasza cena: 14,60 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	30g
Postać	MASC
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	POLYVIDONUM

## Opis produktu

### Opis

Lek do miejscowego stosowania w przypadku oparzeń, owrzodzeń troficznych, zakażeń oraz ran i otarć skórnych.

### Dawkowanie - Betadine, maść, 30 g (import równoległy)

Zewnętrznie. W leczeniu zakażeń: maść nakładać raz lub dwa razy na dobę maksymalnie przez 14 dni. Skórę zmienioną chorobowo należy oczyścić i osuszyć. Na zmienioną skórę nakładać maść. Można założyć opatrunek lub bandaż. Nie zaleca się stosowania u dzieci do 3 miesiąca życia. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

### Składniki - Betadine, maść, 30 g (import równoległy)

1 gram maści zawiera 100 mg jodowanego powidonu.

Substancje pomocnicze: wodorowęglan sodu, makroglol400, makroglol 1500, woda oczyszczona.

### Działania

Dezynfekuje i odkaża skórę.

### Wskazania - Betadine, maść, 30 g (import równoległy)

Oparzenia, rany, otarcia, owrzodzenia, zakażenia skóry.

### **Przeciwwskazania - Betadine, maść, 30 g (import równoległy)**

w przypadku nadwrażliwości lub podejrzenia nadwrażliwości na jod, regularne stosowanie leku jest przeciwwskazane u osób z chorobami tarczycy (w szczególności u osób z wolem guzkowym koloidalnym, wolem endemicznym i zapaleniem tarczycy typu Hashimoto), w opryszczkowym zapaleniu skóry Duhringa, przed i po leczeniu jodem radioaktywnym i scyntygrafii.

### **Przeciwwskazania - Betadine, maść, 30 g (import równoległy)**

Odczyny alergiczne u osób nadwrażliwych, podrażnienia miejscowe, podczas długotrwałego stosowania na większych obszarach skóry zwiększa się wchłanianie jodu, co w konsekwencji może doprowadzić do powstawania wola z równoczesną nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy i wystąpienia objawów ogólnych. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**