

BEWIM 10MG *28 tabletek

Nasza cena: 66,54 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Dawka | 10MG |
| Opakowanie | *28 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | POLFA GRODZISK MAZOWIECKI POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek na receptę pełnopłatny |
| Substancja czynna | PRASUGRELUM |

Opis produktu

Opis

BEWIM 10MG *28 tabletek

Substancja czynna:

Lek Bewim, który zawiera substancję czynną prasugrel, należy do grupy leków zwanych lekami przeciwplatekcyjnymi. Lek Bewim hamuje łączenie się płytek krwi i w ten sposób zmniejsza zagrożenie powstawania zakrzepu. Lek Bewim zmniejsza ryzyko ponownego zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub zgonu z powodu jednego z tych zdarzeń.

Kiedy nie stosować leku Bewim:

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na prasugrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Reakcja alergiczna może objawiać się wysypką, swędzeniem, obrzękiem twarzy, obrzękiem ust lub zadyszką. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który obecnie powoduje krwawienie, np. krwawienie z żołądka lub jelit.

Jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek udar mózgu lub przemijający napad niedokrwienności (TIA).

Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli występuje zwiększone ryzyko krwawienia, takie jak: wiek 75 lat lub powyżej.
- ostatnio przebyte lub nawracające krwawienie z żołądka lub jelit

- choroba nerek lub choroba wątroby o umiarkowanym nasileniu;
- przyjmowanie niektórych leków (patrz poniżej „Lek Bewim a inne leki”);
- planowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym).

Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia, lekarz może zalecić czasowe odstawienie leku Bewim.

Jeśli u pacjenta wystąpiły reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość) na kłopidogrel lub inne leki przeciwplatekcyjne, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Bewim.

Jeśli po przyjęciu leku Bewim wystąpiły reakcje uczuleniowe, takie jak: wysypka, świąd, obrzęk twarzy, obrzęk ust lub duszność, należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.