

# Bibloc 2,5 mg 60 tabletek powlekanych

Nasza cena: 21,86 zł

## Opis słownikowy

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Dawka             | 2,5MG                      |
| Opakowanie        | *60                        |
| Postać            | TABL.POWL.                 |
| Producent         | SANDOZ GMBH AUSTRIA [AT]   |
| Rejestracja       | Lek na receptę pełnopłatny |
| Substancja czynna | BISOPROLOLUM               |

## Opis produktu

### Opis

## Bibloc 2,5 mg 60 tabletek powlekanych

## Wskazania - Bibloc 2,5 mg 60 tabletek powlekanych

Lek jest zalecany do stosowania podczas:

- nadciśnienia tętniczego
- choroby niedokrwiennej serca.
- dławicy sercowej

## Dawkowanie - Bibloc 2,5 mg 60 tabletek powlekanych

Lek stosuje się zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, zaczynając od niskich dawek, stopniowo je zwiększając. Tabletki można dzielić.

Nadciśnienie tętnicze, początkowa dawka to 5 mg w razie konieczności zwiększa się dawkę leku do 10 mg.

Leku nie należy nagle przerywać, należy stopniowo zmniejszać dawkę dobową, gdyż może to spowodować pogorszenie stanu pacjenta.

## Działanie

Substancją czynną preparatu to bisoprolol. Należy do grupy leków o nazwie beta-bloker powodujący blokadę receptorów adrenergicznych typu beta. Receptory te blokują wydzielanie adrenaliny, która powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz naczyń krwionośnych.

Działanie bisoprololu, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca oraz siły jego skurczu, powodując obniżenie ciśnienia tętniczego.

## Skład

1 tabletkę powlekana zawiera 2,5 mg bisoprololu.

## Przeciwwskazania - Bibloc 2,5 mg 60 tabletek powlekanych

Nadwrażliwości na leki  $\beta$ -adrenolityczne lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.

Nie stosować przy ostrej lub przewlekłej niewyrównanej niewydolności serca.

Dodatkowo nie należy stosować leku gdy wystąpił wstrząs kardiogeny, blok przewodzenia przedsionkowo-komorowego II i III°, zespół chorej zatoki, blok przewodzenia zatokowo-predsionkowego, bradykardia (częstość tętna w spoczynku poniżej 50/min. przed rozpoczęciem leczenia), niskie ciśnienie tętnicze krwi, kwasica metaboliczna, choroba obturacyjna oskrzeli, astma oskrzelowa, zaawansowane zaburzenia krążenia obwodowego.

## Działania niepożądane

Szczegółowa lista działańniepożądanych znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania leku.

Podczas stosowania leku mogą pojawić się duszności ,głównie u pacjentów z astmą oskrzelową, chorobą obturacyjną oskrzeli.

Może nastąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Mogą wystąpić również następujące objawy niepożądane : obrzęki obwodowe, duszność, osłabienie siły mięśni, kurcze mięśni (np. mięśni łydek). uczucie nadmiernego zmęczenia, zawroty oraz bóle głowy, depresja, dezorientacja, koszmary nocne, zaburzenia snu, halucynacje,, nadmierne uczucie zimna kończyn.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.