Serwis Internetowy Świat Leku
Górnicza 2, Łęczyca
+48 24 721 05 34

BIJUVA 1MG+0,1G *28 kapsułek miękkich

Nasza cena: 56,85 zł

Opis słownikowy

Dawka	1MG+0,1G
Opakowanie	*28
Postać	KAPS.MIEKKIE
Producent	THERAMEX IRELAND LIMITED IRLANDIA [IE]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ESTRADIOLUM, PROGESTERONUM

Opis produktu

Opis

BIJUVA 1MG+0,1G *28

Zastosowane

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w objawach niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie z zachowaną macicą.

P.o., 1 tabl./d wieczorem, z posiłkiem.

Lek należy stosować przez jak najkrótszy czas.

W przypadku naturalnej menopauzy leczenie można rozpocząć 12 mies. od wystąpienia ostatniego naturalnego krwawienia miesiączkowego.

W przypadku menopauzy wywoływanej chirurgicznie, leczenie można rozpocząć natychmiast.

Pacjentki zmieniające leczenie z innego leku złożonego przyjmowanego w sposób ciągły mogą rozpocząć leczenie w dowolnym momencie, natomiast pacjentki zmieniające leczenie z terapii ciągłej sekwencyjnej lub terapii cyklicznej mogą rozpocząć leczenie po zakończeniu 28-dniowego cyklu.

Skład

Substancjami czynnymi leku są estradial (w postaci estradiolu półwodnego) i progesteron. Pozostałe składniki to: mono/diglicerydy o średniej długości łańcucha, makrogologlicerydów lauryniany 32, żelatyna, żelatyna hydrolizowana, gliceryna, czerwień Allura (E 129), dwutlenek tytanu (E 171), glikol propylenowy, poliwinylu octanoftalan, glikol polietylenowy i amonu wodorotlenek.

Skutki uboczne

U kobiet stosujących HTZ występuje zwiększone ryzyko rozwoju następujących chorób, w porównaniu do kobiet niestosujących HTZ:

• rak piersi;

• nadmierny rozrost lub rak błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium lub rak endometrium); • rak jajnika;

• zakrzepy krwi w żyłach kończyn dolnych lub płuc (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa);

• choroba niedokrwienna serca;

• udar mózgu;

• prawdopodobna utrata pamięci, jeśli rozpoczęto stosowanie HTZ w wieku powyżej 65 lat. Więcej informacji na temat tych działań niepożądanych można znaleźć w punkcie 2.

Należy poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych podczas stosowania leku BIJUVA:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentek):

• tkliwość piersi.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentek):

• ból głowy, zawroty głowy,

• zmiany nastroju,

• zmęczenie,

• ból pleców,

• ból brzucha, niestrawność,

• ból w obrębie miednicy,

• zwiększenie masy ciała,

• trądzik, suchość skóry,

• ból piersi,

• nudności,

• upławy z pochwy (biała lub żółtawa wydzielina z pochwy),

• krwawienie z dróg rodnych lub silne skurcze macicy,

• wypadanie włosów,

• ból kończyn (np. ból pleców, ramion, nóg, nadgarstków, kostek).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentek):

• niska zawartość żelaza we krwi,

• wysokie ciśnienie krwi,

• zatrzymanie płynów w kończynach dolnych,

• podwyższone stężenie cholesterolu,

• nadmierny apetyt,

• problemy z oddawaniem moczu i wypróżnianiem

• ból mięśni,

• rak piersi,

• krótszy sen,

• guzy macicy lub jajowodu,

• utrata pamięci, silne bóle głowy,

• uczucie mrowienia,

• utrata węchu,

• trudności w zasypianiu lub nietypowe sny,

• zmiany nastroju lub drażliwość,

• wymioty,

• suchość w jamie ustnej,

• zaparcia,

• biegunka,

• utrata masy ciała, zawroty głowy,

• dreszcze,

• ostre zapalenie trzustki,

• lęk, przygnębienie,

• większe zainteresowanie aktywnością seksualną niż zwykle,

• uderzenia gorąca,

• podrażnienie lub pieczenie pochwy,

• zakażenia pochwy, np. drożdżyca,

• zakrzepy krwi,

• suchość i swędzenie skóry lub przebarwienie skóry,

• wysypka lub pojawienie się czerwonych linii na skórze,

• zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,

• nadmierne owłosienie,

• zaburzenia widzenia,

• uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, tkliwość brzucha,

• niestrawność,

• hiperfagia (nadmiernie zwiększone łaknienie),

• uczucie dyskomfortu w jamie ustnej,

• zaburzenia smaku,

• wzdęcia,

• nadwrażliwość,

• zapalenie żołądka i jelit,

• czyraki,

• ostre zapalenie ucha środkowego,

• nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby,

• bóle kończyn,

• torbiele w obrębie przydatków macicy,

• zaburzenia uwagi,

• parestezja (czucie opaczne),

• omamy węchowe,

• pobudzenie,

• choroby piersi,

• dysplazja sutka,

• ból sutków,

• nowotwór niezłośliwy sutka,

• przerost błony śluzowej macicy (endometrium),

• nieprawidłowy wynik biopsji,

• krwawienie pomenopauzalne,

• świąd sromu i pochwy oraz teleangiektazje.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentek): • osłabienie mięśni,

• łagodne guzy wywodzące się z komórek mięśni gładkich macicy,

• torbiele w pobliżu jajowodów.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10000 pacjentek):

• świąd, ciemne zabarwienie moczu.

Podczas stosowania innych HTZ zgłaszano następujące działania niepożądane:

• choroba pęcherzyka żółciowego,

• różne choroby skóry:

- przebarwienie skóry, szczególnie na twarzy lub szyi, określane mianem „plam ciążowych" (ostuda ciążowa),

- bolesne zaczerwienione guzki na skórze (rumień guzowaty),

- wysypka z zaczerwienieniem lub owrzodzeniami w kształcie pierścieni (rumień wielopostaciowy).

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.