

Bioracef 500 mg 14 tabletek

Nasza cena: 24,84 zł

Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*14 BLISTER
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	CEFUROXIMUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- ostre paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków,
- bakteryjne zapalenie zatok przynosowych,
- ostre zapalenie ucha środkowego,
- zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli,
- zapalenie pęcherza moczowego,
- odmiedniczkowe zapalenie nerek,
- niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich,
- leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy).

Dawkowanie:

- produkt powinien być stosowany pod kontrolą lekarza i według jego zaleceń,
- dawka leku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań,
- leczenia zwykle trwa 7 dni (niekiedy długość stosowania może zostać skrócona do 5 dni, lub też wydłużona do 10 dni),

- zazwyczaj stosuje się dawkę wynoszącą 500 mg do 2 razy na dobę,
- stosowanie produktu u dzieci z wagą poniżej 40kg należy skonsultować z lekarzem.

Działanie:

Aksetyl cefuroksymu jest hydrolizowany przez enzymy - esterazy, do aktywnego antybiotyku, cefuroksymu. Cefuroksym hamuje syntezę bakteryjnych ścian komórkowych w następstwie połączenia się z białkami wiążącymi penicyliny (ang. PBP). Następuje przerwanie procesu biosyntezy ściany komórkowej (peptydoglikanu), co prowadzi do lizy komórki bakteryjnej i do jej obumarcia.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 500 mg cefuroksymu (w postaci cefuroksymu aksetylu).

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na cefuroksym lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- stwierdzona wcześniej nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe,
- ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna) na jakikolwiek inny antybiotyk β -laktamowy (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy) w wywiadzie.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować działania niepożądane.

Do najczęstszych z nich należą:

- nadmierny wzrost Candida,
- eozynofilia,
- leukopenia,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- biegunka,
- nudności,
- ból brzucha,
- przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Należy zauważyć iż działania niepożądane mogą występować jedynie u części pacjentów. Działania te mogą również objawiać się w różny sposób. Pacjent powinien zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania w której zostały wyszczególnione wszystkie działania niepożądane towarzyszące przyjmowaniu leku.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.