

Biosotal 40 60 tabletek 40 mg

Nasza cena: 9,59 zł

Opis słownikowy

Dawka	40MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	SOTALOLUM

Opis produktu

Opis

Wskazania

Lek Biosotal przepisywany jest przez lekarza w trakcie leczenia takich chorób jak:

- komorowe zaburzenia rytmu serca
- nadkomorowe zaburzenia rytmu serca
- zaburzenia rytmu serca w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White
- migotanie przedsionków
- trzepotanie przedsionków
- arytmia

Dawkowanie

Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zalecana początkowa dawka to 80 mg dziennie, stopniowo co 2- 3 dni zwiększa się dawkę dobową o 40mg.

Nie zaleca się nagle przerywać leczenia, tylko stopniowo zmniejszać dawkę.

Działanie

Lek wykazuje silne działanie przeciwarytmiczne, szczególnie rytmu serca pochodzenia komorowego. Zwalnia przyspieszoną czynność serca, obniża ciśnienie tętnicze krwi. Zmniejsza objętość minutową serca.

Skład

1 tabletkę zawiera 40 mg chlorowodoru sotalolu

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną sotalol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.

Dodatkowo leku nie należy stosować podczas gdy występuje nadciśnienie nie spowodowane przez arytmie, nieleczone guz chromochłonny nadnerczy, zespół chorego węzła zatokowego, bradykardia, znaczna niewydolność nerek, zaburzenia krążenia obwodowego, dychawica oskrzelowa, kwaśnica metaboliczna i oskrzeli.

Działania niepożądane

Podczas stosowania leku mogą pojawić się działania niepożądane takie jak :

- kołatanie serca
- omdlenia
- zaburzenia snu
- zmiany w zapisie EKG
- uczucie zmęczenia
- depresja

Zgłaszano również zaburzenia żołądkowo- jelitowe : nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.