

Bisacodyl Vp tabletki dojeliotowe 5mg x 30 (import równoległy Bułgaria)

Nasza cena: 7,96 zł

Opis słownikowy

Dawka	5 MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.DOJELIT.
Producent	Lab.galen.olsztyn/cefarm
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Sposób użycia:

Doustnie.

Dorośli i dzieci powyżej 10 r.ż.: 1-2 tabl. raz dziennie (na noc).

U osób w wieku podeszłym, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Dzieci 4-10 r.ż.: 1 tabl. raz dziennie (na noc).

Preparat należy połknąć w całości i obficie popić wodą, nie rozgryzać ani nie rozkruszać.

Składniki:

Bisakodyl, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, żelatyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, polisorbata 20, talk, tytanu dwutlenek, czerwień koszenilowa, lak, symetykon.

Działania:

Jest środkiem przeczyszczającym i wiatropędnym działającym bezpośrednio na jelito grube. W wyniku działania na nerwy w ścianie jelita nasila skurcze jelit i pobudza ruchy perystaltyczne. Lek zwiększa również ilość niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym, co wzmacnia jego działanie przeczyszczające.

Wskazania:

Preparat stosowany w zaparciach różnego pochodzenia: nawykowych i przewlekłych zaparcia u obłożnie chorych, nawykowych zaparciach w podeszłym wieku, zaparciach po zmianie diety, zaparciach w okresie pooperacyjnym. Polecany w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Zespół ostrego brzucha (w tym niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego). Bóle brzucha o nieznannej etiologii z obecnością nudności i wymiotów. Choroba Leśniowskiego-Crohna. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Krwawienie z przewodu pokarmowego. Ciężkie odwodnienie. Dzieci do 4lat.

Bardzo rzadko reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktooidalnymi, bóle brzucha, biegunka.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.