

Bobodent, żel 10 g



Nasza cena: 26,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 g
Postać	ZEL
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LIDOCAINUM

Opis produktu

Opis

Bobodent, żel 10 g

Preparat stosowany w stanach zapalnych dziąseł przy ząbkowaniu oraz przy wyrzynaniu się zębów mądrości.

Dawkowanie - Bobodent, żel 10 g

Lek stosuje się zewnętrznie na błony śluzowe jamy ustnej.

Kroplę żelu wielkości ziarna grochu wcierać w bolesne miejsce czystym palcem lub wacikiem.

Zabieg powtórzyć 3 razy na dobę (maksymalnie 6 razy), szczególnie po posiłkach i przed zaśnięciem.

Składniki - Bobodent, żel 10 g

100 g żelu zawiera:

substancję czynną: chlorowodorek lidokainy,

substancje pomocnicze: wyciąg suchy z rumianku, wyciąg suchy z tymianku, sorbitol ciekły niekryształujący, sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydrobenzoesan, karbomer 5984, glikol propylenowy, disodu edetynian, polisorbat 20, sodu wodorotlenek (r-r 30%), woda oczyszczona.

Działania

Preparat zawiera lidokainę, która działa miejscowo znieczulająco, wyciągi: rumiankowy i tymiankowy działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Wskazania - Bobodent, żel 10 g

Stosowany w stanach zapalnych dziąseł przy ząbkowaniu oraz przy wyrzynaniu się zębów mądrości, w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł.

Przeciwwskazania - Bobodent, żel 10 g

Nie stosować leku:

- jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną, środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- w przypadku znacznych uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł w postaci zmian troficznych śluzówki obrzęku czy owrzodzenia

Przeciwwskazania - Bobodent, żel 10 g

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami jest na ogół dobrze tolerowany.

Mogą wystąpić odczyny uczuleniowe, jak pokrzywka czy obrzęk w miejscu podania.

Stosowanie lidokainy w obrębie jamy ustnej może powodować znieczulenie kubków smakowych i w konsekwencji zaburzenia smaku.

Znieczulający wpływ lidokainy na część ustną gardła może prowadzić do znieczulenia odruchu gardłowego (wymiotnego).

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

Lidokaina przenika przez łożysko i do mleka matki.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.