

Boldaloin, 30 tabletek



Nasza cena: 15,68 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	HERBAPOL-WROCLAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ALOE SP., BOLDINUM

Opis produktu

Opis

Boldaloin, 30 tabletek

Boldaloin działając kompleksowo wpływa korzystnie na cały układ trawienny znacząco polepszając jego pracę. W ten sposób nie tylko czujesz się lepiej (pozbywasz się zapań), ale też lepiej dbasz o swój organizm.

Dawkowanie

Jako środek regulujący wypróżnienia: od 1 do 3 tabletek jednorazowo, wieczorem.

Jako preparat żółciopędny i pobudzający wydzielanie soków żołądkowych: dorosłym doustnie 3 razy dziennie po 1 tabletkę, dzieciom powyżej 12 roku życia i osobom w podeszłym wieku od 1 do 2 tabletek dziennie.

Skład

Substancje czynne:

Aloes extractum siccum (2:1), ekstrahent: woda oczyszczona 23,6 mg

Boldinum 1,0 mg

Substancje pomocnicze :

skrobia ziemniaczana, sacharoza, guma arabska, glicerol, talk, magnezu stearynian

Wskazania

Tradycyjnie w niestrawności z uczuciem pełności w jamie brzusznej, zaburzeniach wydzielania żółci i soku żołądkowego, w lekkich skurczowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Tradycyjnie w regulacji częstości wypróżnień (w łagodnych zaparciach związanych ze zmianą diety, miejsca pobytu).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu, marskości wątroby, niedrożności dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, zwężeniu przewodu pokarmowego, atonii jelit (zanik prawidłowego napięcia mięśni gładkich), zapaleniu wyrostka robaczkowego, chorobach zapalnych jelita grubego (np. choroba Cronha, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bólach brzucha z nieznanych przyczyn, niewydolności nerek, bieguncie, zaburzeniach równowagi wodno-elektrolitowej. Boldaloinu nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Możliwe działania niepożądane

Zwykle nie obserwuje się działań niepożądanych. Sporadycznie mogą wystąpić wymioty, biegunka, hipokaliemia (obniżenie poziomu potasu), kolka żółciowa oraz reakcje alergiczne na składniki preparatu.

Przy wystąpieniu objawów niepożądanych należy lek odstawić.

W rzadkich przypadkach może dojść do zmiany zabarwienia moczu.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Interakcje

W dużych dawkach w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, adrenokortykosteroidami i korzeniem lukrecji, potencjalnie może powodować hipokaliemię (obniżenie poziomu potasu). Nie zaleca się też jednoczesnego stosowania z lekami przeciwartymicznymi oraz lekami przeczyszczającymi.

Uwagi

Stosowanie leku Boldaloin w okresie ciąży i karmienia piersią:

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Ewentualne stosowanie preparatu dopuszczone jest jedynie za zgodą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku Boldaloin na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.