

Borasol jałowy, 3%, płyn 200 g



Nasza cena: 7,70 zł

Opis słownikowy

Dawka	3%
Opakowanie	200 g
Producent	Prolab F.P.P. Nakło nad Notecią
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym do stosowania zewnętrźnie.

Dawkowanie - Borasol jałowy, 3%, płyn 200 g

Do stosowania na skórę. Zwykle przeciera się lekiem chorobowo zmienione miejsca od 2 do 3 razy na dobę. Stosować w postaci przymoczek, okładów, płukań. Stosować przez krótki okres czasu

Składniki - Borasol jałowy, 3%, płyn 200 g

1g roztworu na skórę zawiera substancję czynną 30mg kwasu borowego i substancję pomocniczą wodę oczyszczoną.

Działania

Przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne.

Wskazania - Borasol jałowy, 3%, płyn 200 g

Preparat do stosowania zewnętrznego w leczeniu stanów zapalnych skóry i zewnętrznych narządów moczowo-płciowych, wyprysku, oparzeń, stłuczeń, obrzęków, powierzchownych uszkodzeń naskórka.

Przeciwwskazania - Borasol jałowy, 3%, płyn 200 g

Nie należy stosować doustnie, do oczu, na rozległe rany, skaleczenia, na duże powierzchnie skóry, u niemowląt.

Przeciwwskazania - Borasol jałowy, 3%, płyn 200 g

Zaczerwienienie, wysypka, łuszczenie się naskórka, brak łaknienia, wymioty, biegunka, drgawki, gorączka, zapaść, uszkodzenie nerek, skąpomocz, senność, śpiączka. Jeśli lek jest stosowany długotrwale mogą wystąpić objawy przewlekłego zatrucia kwasem borowym takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zapalenie skóry, zaburzenia miesiączkowania, niedokrwistość, osłabienie, drgawki i wyłysienie.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.