

Borowinowy Plaster, 5 sztuk torebek



Nasza cena: 19,48 zł

Opis słownikowy

Producent	BIOCHEM-MICHALIK POLSKA
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Borowinowy Plaster firmy Biochem-Michalik, jest to preparat do użytku zewnętrznego. Przeznaczony jest do jednorazowych okładów stosowanych na skórę. Bardzo często używany jest do zawiązań w sanatoriach i gabinetach rehabilitacyjnych.

Na co działa Plaster Borowinowy?

Plaster Borowinowy należy stosować w doległościach związanych z procesami zapalnymi stawów oraz w stanach bólowych po stłuczeniach.

Jak działa borowinowy plaster?

Stosując ciepłe okłady i kąpiele z użyciem preparatu borowinowego załagadzamy dolegliwości bólowe związane ze stanem zapalnym.

Przeciwwskazania w stosowaniu plastrów borowinowych.

Dotychczas nie stwierdzono przy miejscowym stosowaniu okładów z plastrów borowinowych.

Z pewnością nie wolno preparatu nakładać w okolice serca. Nie wolno stosować preparatu na uszkodzoną skórę (obtarcia, rany, oparzenia).

Czy kobiety w ciąży mogą stosować kurację plastrami borowinowymi?

Ze względu na brak odpowiednich badań, nie należy stosować terapii plastrami borowinowymi w czasie ciąży oraz w czasie karmienia dziecka.

Jak stosować terapię plastrami borowinowymi?

1. Plaster w torebce z folii zanurzyć w naczyniu w gorącą wodą na około 15 minut. Czekamy aż plaster osiągnie temperaturę około 40 stopni C.
2. Plaster należy wyjąć z wody, odciąć nożyczkami oba krótsze boki torebki, a następnie należy przeciąć przez środek powierzchni torebki.
3. Przeciętą torebkę należy odchylić na zewnątrz i odkrytą powierzchnię plastra przyłożyć na chore miejsce.
4. Plaster należy dokładnie uformować przyległa dokładnie do chorego miejsca. Przeciętą folię należy pozostawić na zewnątrz a okład powinno przykryć się ręcznikiem lub kocem w celu zwiększenia efektu. Czas trawania zabiegu to około 30 minut. Pokrycie całego kręgosłupa bądź też większych fragmentów ciała uzyskuje się po przez jednoczesne stosowanie dwóch lub więcej plastrów.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.