

Brodacid, płyn na skórę, 8 g



cena: 21,22 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	8g
Postać	PLYN
Producent	INCO-VERITAS SP.Z.O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM LACTICUM, ACIDUM SALICYLICUM

Opis produktu

Opis

Co to jest za lek Brodacid i kiedy się go stosuje?

Brodacid jest lekiem dostępnym bez recepty, przeznaczonym do stosowania na skórę w postaci płynu. Zawiera dwie substancje czynne: **kwasy salicylowy** i **kwasy mlekowy**, które działają synergistycznie w leczeniu zmian skórnych.

Wskazania do stosowania leku Brodacid:

- leczenie **brodawek zwykłych**,
- leczenie **brodawek okołopaznokciowych**,
- leczenie **brodawek stóp**,
- leczenie **brodawek mozaikowych**.

Skład

1 gram płynu na skórę **Brodacid** zawiera:

- substancje czynne:**
 - kwasy mlekowy:** 50,4 mg (w postaci 90% roztworu kwasu mlekowego),
 - kwasy salicylowy:** 100 mg,
- substancje pomocnicze:**
 - nitroceluloza (2:1) + octan etylu,
 - dimetylosulfotlenek.

Wygląd opakowania i dostępne opakowania

Lek **Brodacid** ma postać płynu na skórę. Opakowanie to bezbarwna szklana butelka zawierająca 8 g płynu na skórę, wyposażona w aplikator polietylenowy i zakrętkę. Całość umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Działanie leku

Działanie leku **Brodacid** opiera się na właściwościach jego substancji czynnych:

- **Kwas salicylowy** działa **keratolitycznie**, co oznacza, że zmiękcza i rozpuszcza zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.
- **Kwas mlekowy** jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry, przyczyniając się do usunięcia brodawki.
- **Dimetylosulfotlenek**, jako substancja pomocnicza, zwiększa przenikanie składników czynnych w głąb tkanki, co potęguje skuteczność działania leku.

Przeciwwskazania

Leku **Brodacid** nie należy stosować w następujących przypadkach:

- jeśli pacjent ma **uczulenie** na substancje czynne (kwas mlekowy lub kwas salicylowy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w leczeniu **brodawek płaskich**,
- na zmiany zlokalizowane w okolicy **oczu**, na **błonach śluzowych** oraz na **twarzy**,
- na **znamiona owłosione i nieowłosione**,
- na **zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę**,
- w okresie **ciąży i karmienia piersią**,
- u **dzieci w wieku poniżej 2 lat**.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku **Brodacid** należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

- Lek jest przeznaczony **wyłącznie do użytku zewnętrznego**.
- Należy **przerwać leczenie**, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.
- Należy **chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe**. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody.
- Lek należy nakładać **wyłącznie na brodawki**.
- **Nie należy stosować leku leczniczego na niezmienną zdrową skórę**, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego.
- Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej brodawkę zdrowej skóry, należy **natychmiast przemyć ją wodą**.
- W razie przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować, tak jak to opisano w ulotce pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie u dorosłych

Lek należy stosować **dwa razy na dobę** na czystą i suchą skórę. Smarować należy wyłącznie powierzchnię brodawki. Czas leczenia wynosi kilkanaście dni, maksymalnie do 6-8 tygodni, w zależności od wyniku leczenia.

Dawkowanie u dzieci

- Nie stosować u dzieci w wieku **poniżej 2 lat**.
- U dzieci w wieku **od 2 do 12 lat** lek można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku (przedawkowanie)

Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Sposób użycia leku

Aby prawidłowo zastosować lek **Brodacid**, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Czystą i suchą powierzchnię brodawki smarować lekiem za pomocą aplikatora.
2. Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki.
3. Następnie posmarować **wyłącznie powierzchnię brodawki**, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę, błony śluzowe lub do oczu.
4. Po posmarowaniu brodawki odczekać chwilę, aż płyn zaschnie w postaci białej błonki.
5. Stosować dwa razy na dobę na czystą i suchą skórę.
6. Smarować wyłącznie powierzchnię brodawki, w zależności od wyniku leczenia przez kilkanaście dni, maksymalnie do 6-8 tygodni.

Skutki przerwania stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Brak szczegółowych informacji w ulotce dotyczących specyficznych skutków przerwania stosowania leku.

Interakcje z lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Ulotka nie zawiera szczegółowej listy potencjalnych interakcji leku **Brodacid** z innymi lekami.

Interakcje z jedzeniem, pićciem i alkoholem

Brak danych klinicznych w ulotce dotyczących interakcji leku **Brodacid** z jedzeniem, pićciem lub alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, **lek nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią**.

Stosowanie u dzieci i osób starszych

Stosowanie u dzieci

- Nie stosować u dzieci w wieku **poniżej 2 lat**.
- U dzieci w wieku **od 2 do 12 lat** lek można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Stosowanie u osób starszych

Brak szczegółowych zaleceń dotyczących stosowania leku u osób starszych w ulotce.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek **Brodacid** nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, **Brodacid** może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane:

- W obrębie skóry otaczającej brodawkę może wystąpić **pieczenie** i **nadżerki** pozostawiające przemijające przebarwienia.

W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Przechowywanie

Lek **Brodacid** należy przechowywać w następujący sposób:

- Przechowywać w miejscu **niedostępnym i niewidocznym dla dzieci**.
- Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
- Przechowywać w temperaturze **poniżej 25°C**.
- Lek jest **łatwopalny**.
- Z uwagi na łatwopalność produktu, przechowywać **z dala od ognia i źródeł ciepła**.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Rola	Dane
Podmiot odpowiedzialny	GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa
Wytwórca	Wydział Produkcji Leków ul. Ks. Kurowskiego 93 05-080 Izabelin Os. Hornówek
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:	Wydział Produkcji Leków 05-080 Izabelin tel. 22 722 89 01 fax. 22 722 89 00

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.