

# Broncho-Vaxom kapsułki 7 mg x 30 (import równoległy Bułgaria)

Nasza cena: 89,79 zł

## Opis słownikowy

Dawka	7 MG
Opakowanie	30 kaps.
Postać	KAPS.TWARDE
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	SZCZEPIONKA WIELOWAŻNA

## Opis produktu

### Opis

### Co to jest Broncho-Vaxom i w jakim celu się go stosuje

Broncho-Vaxom jest lekiem stymulującym układ immunologiczny. Zawiera lizat bakterii najczęściej wywołujących zakażenia dróg oddechowych.

U ludzi, lek pobudza mechanizmy odporności komórkowej i humoralnej przez aktywację makrofagów, zwiększanie liczby krążących limfocytów T oraz zwiększanie stężenia immunoglobulin wydzielanych przez błonę śluzową układu oddechowego.

### Wskazania do stosowania leku Broncho-Vaxom są następujące:

- zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych (ZDO) u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.

### Skład:

- 1 kapsułka Broncho-Vaxom zawiera 40 mg liofilizatu OM-85, co wynosi 7 mg lizatów bakterii aemophilus influenzae, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i ssp. ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i sanguinis (viridans), Moraxella (Branhamella/Neisseii) catarrhalis.
- Pozostałe składniki: galusan propylu (E 310), sodu glutaminian (E 621), mannitol, skrobia żelowana, magnezu stearynian.
- Oślonka: żelatyna, indygotyna (E 132), tytanu dwutlenek (E 171).

### Przeciwwskazania:

### Kiedy nie należy stosować leku Broncho-Vaxom

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

## Dawkowanie:

Należy go przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Broncho-Vaxom jest lekiem do stosowania doustnego u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.

*Zaleca się stosować przez trzy kolejne miesiące według schematu:*

- 1 kapsułka na dobę, na czczo przez 10 kolejnych dni w miesiącu, przez 3 miesiące.

Można też zawartość kapsułki wsypać do szklanki z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą i wypić. Ten sposób jest zalecany szczególnie u małych dzieci.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, ten lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

### Często (mogą występować maksymalnie u 1 na 10 pacjentów):

- ból głowy,
- kaszel,
- biegunka,
- ból brzucha,
- wysypka.

### Niezbyt często (mogą występować maksymalnie u 1 na 100 pacjentów):

- nudności,
- wymioty,
- niestrawność,
- pokrzywka,
- gorączka,
- zmęczenie

Reakcje alergiczne, w tym:

- wysypka,
- zaczerwienienie,
- obrzęk powiek, twarzy, kostek, stóp lub palców,
- swędzenie,
- nagła duszność lub trudności w oddychaniu.

### Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- Obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, stóp i dłoni.

W przypadku reakcji skórnych i zaburzenia układu oddechowego, zaburzenia żołądka i jelit, należy przerwać stosowanie leku Broncho-Vaxom i zasięgnąć porady lekarza.

## Lek Broncho-Vaxom a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji pomiędzy lekiem Broncho-Vaxom a innymi lekami.

## Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### Ciąża

Chociaż nie ma danych na temat jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych leku w odniesieniu do zarodka lub płodu, to jednak lek Broncho-Vaxom nie powinien być stosowany w trakcie ciąży.

### Karmienie piersią

Nie przeprowadzono żadnych badań oceniających stosowanie leku u kobiet karmiących piersią. Dlatego też w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.

## Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń maszyn.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.