

Bronchosol MAXIPUREN, 200 mg, kapsułka dojelitowa, miękka, 30 sztuk

Nasza cena: 35,21 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	EUCALYPTUS

Opis produktu

Opis

Bronchosol MAXIPUREN, 200 mg, kapsułka dojelitowa, miękka, 30 sztuk

Substancja czynna

Jedna kapsułka produktu leczniczego **Bronchosol MAXIPUREN** zawiera 200 mg *Eucalyptus globulus Labill*, *Eucalyptus polybractea R.T. Baker*, *Eucalyptus smithii R.T. Baker*, *aetheroleum* (olejek eukaliptusowy).

Postać farmaceutyczna

Kapsułka dojelitowa, miękka.

Wskazania do stosowania

Lek **Bronchosol MAXIPUREN** stosowany jest: wspomagająco w chorobach przeziębieniowych i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z towarzyszącym kaszlem, katarciem i trudnością z odkrztuszaniem lepkiego śluzu; wspomagająco w nieropnych stanach zapalnych zatok przynosowych.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży od 12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na olejek eukaliptusowy, jego składniki (1,8- cyneol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą: żelatyny bursztynian, glicerol 85%, sorbitol ciekły, niekryształujący, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) z dodatkiem polisorbatu 80 i sodu laurylosiarczanu, glikol propylenowy, polisorbit 80, glicerolu monostearynian 40-55.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku, gdy objawy utrzymują się dłużej niż tydzień lub gdy wystąpią duszności, podwyższona temperatura ciała, odkrztuszanie ropnej lub krwistej wydzieliny pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem. Olejek eukaliptusowy może działać drażniąco na przewód pokarmowy, szczególnie u osób ze stanami zapalnymi przewodu pokarmowego. Zastosowanie postaci farmaceutycznej z otoczką dojelitową zmniejsza ryzyko wystąpienia działania drażniącego olejku w porównaniu do kapsułek bez otoczki.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież od 12 lat: 1 kapsułka 2 – 3 razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat.

Bronchosol MAXIPUREN należy stosować do czasu ustąpienia objawów, zazwyczaj przez 1 tydzień. Lek przyjmować 15 minut przed posiłkiem popijając wodą, połykać w całości, nie rozgryzać.

Podmiot odpowiedzialny

Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.