

# Bronchostop Duo syrop na kaszel suchy, 200 ml



Nasza cena: 26,79 zł

## Opis słownikowy

Dawka	(0,12G+0,83G)/15ML
Opakowanie	200ml
Postać	SYROP
Producent	F.JOH.KWIZDA GMBH AUSTRIA [AT]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	THYMUS VULGARIS, ALTHAEA OFFICINALIS

## Opis produktu

### Opis

## Bronchostop Duo syrop na kaszel suchy

### Wskazania

Bronchostop Duo syrop na kaszel suchy to lek w postaci syropu, wskazany do stosowania w procesie leczenia kaszlu będącego objawem chorób układu oddechowego. Lek wskazany do stosowania od 3 roku życia.

### Właściwości

Bronchostop Duo syrop na kaszel suchy to tradycyjny produkt leczniczy roślinny o smaku malinowym stosowany do pobudzania odkrztuszania zalegającego, gęstego śluzu w przypadku kaszlu związanego z przeziębieniem oraz do uśmierzenia podrażnienia gardła i związanego z tym suchego kaszlu.

### Dawkowanie

Lek odmierzać za pomocą dołączonej miarki.

#### Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

15 ml co 3 do 4 godzin, 4 razy na dobę. W razie konieczności maksymalnie 6 razy na dobę, przy czym maksymalna dawka dobową wynosi 90 ml.

#### Dzieci w wieku 6 – 12 lat:

7,5 ml co 3 do 4 godzin, 4 razy na dobę. W razie konieczności maksymalnie 6 razy na dobę, przy czym maksymalna dawka dobową wynosi 45 ml.

**Dzieci w wieku 3 – 6 lat:**

Wyłącznie po konsultacji z lekarzem: 7,5 ml co 3 do 4 godzin, 4 razy na dobę (w razie konieczności można podać maksymalnie 6 razy na dobę, przy czym maksymalna dawka dobową wynosi 45 ml).

**Przeciwwskazania**

Nadwrażliwość na substancje czynne, inne rośliny należące do rodziny Lamiaceae lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

W przypadku pojawienia się duszności, gorączki lub ropnej wydzieliny należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci do 3 lat nie jest zalecane ze względu na brak dostępnych danych. Zawiera środki konserwujące (parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) oraz koncentrat soku malinowego, w którego składzie obecna jest sacharoza, glukoza i fruktoza. Pacjenci z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować leku.

Zawiera ksylitol, który może działać przeczyszczająco (wartość kaloryczna 2,4 kcal/g ksylitolu).

**Ważne**

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**