

## BRONCHOSTOP na kaszel, 20 pastylek miękkich



Nasza cena: 18,49 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	PASTYLKI MIEKKIE
Producent	KWIZDA PHARMA GMBH AUSTRIA [AT]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	THYMUS VULGARIS

### Opis produktu

#### Opis

### BRONCHOSTOP na kaszel, 20 pastylek miękkich

Lek BRONCHOSTOP na kaszel to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany do pobudzania odkrztuszania zalegającego, gęstego śluzu w przypadku kaszlu związanego z przeziębieniem.

#### Wskazania

Ten lek jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania w podanym wskazaniu wyłącznie na podstawie długotrwałego stosowania.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem

#### Skład

Substancją czynną jest suchy ekstrakt z ziela tymianku *Thymus Vulgaris* L. i/lub *Thymus zygis* L., (7-13:1), ekstrahent: woda

Pozostałe składniki to:

guma arabska, guma arabska suszona rozpyłowo (E 414), fruktoza, sorbitol ciekły, niekryształizujący (E 420), maltodekstryna, kwas cytrynowy bezwodny (E 330), sacharyna sodowa (E 954), aromat aroniowy, aromat owoców leśnych, parafina ciekła lekka, wosk biały (E901), woda oczyszczona.

#### Dawkowanie

Dzieci i młodzież powyżej 12 lat:

1-2 pastylki, co 4 godziny, 4 razy dziennie. W razie konieczności można przyjąć maksymalnie 12 pastylek dziennie.

Dzieci 6 – 12 lat:

1 pastylka, 3 razy dziennie.

Dzieci do 6 lat:

**Nie jest zalecane stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.**

Do podawania doustnego (ssać i powoli rozpuszczać w jamie ustnej).

### **Czas trwania podawania**

Czas samodzielnego podawania leku BRONCHOSTOP na kaszel należy ograniczyć do 7 dni.

Jeżeli do tego czasu nie nastąpi istotna poprawa, zaleca się konsultację u lekarza, ponieważ pacjent może chorować na bardziej poważne schorzenie.

**Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**