

Bufenik, syrop, 200mg/5ml, 100 ml



Nasza cena: 14,77 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|-----------------|
| Dawka | 200MG/5ML |
| Opakowanie | 100 ml |
| Postać | SYROP |
| Producent | Ratiopharm Gmbh |
| Rejestracja | Lek bez recepty |

Opis produktu

Opis

Preparat polecany w leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego oraz w leczeniu gorączki.

Dawkowanie - Bufenik, syrop, 200mg/5ml, 100 ml

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia jednorazowo 5-10 ml syropu. Maksymalna dawka dobową 30 ml. U dzieci młodszych dawka zależy od masy ciała.

W celu ułatwienia dokładnego dawkowania, do opakowania dołączono strzykawkę doustną z nadrukowaną skalą. Przed użyciem należy wstrząsnąć butelką. Aby otworzyć butelkę, nakrętkę należy przycisnąć, jednocześnie obracać w kierunku zgodnym z rzeźbioną strzałką. Umieścić strzykawkę w szyjce butelki. Przytrzymując strzykawkę, delikatnie odciągnąć tłok do dołu, w celu napełnienia strzykawki syropem do odpowiedniego poziomu. Obrócić butelkę do dołu dnem i delikatnie obrócić strzykawkę w celu wyjęcia jej z szyjki butelki. Aby dodać lek dziecku, końcówkę strzykawki należy umieścić w ustach dziecka. Powoli naciskać tłok strzykawki, aby wycisnąć syrop. Należy robić to powoli, w celu umożliwienia dziecku połknięcia syropu. Po użyciu należy dokładnie zakręcić nakrętkę, tak aby zabezpieczyć butelkę przed dostępem dzieci.

Składniki - Bufenik, syrop, 200mg/5ml, 100 ml

5ml zawiera 200 mg ibuprofenu.

Inne składniki: guma kasantan, polisorbat 80, potasu sorbinian, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, sacharoza, glukoza bezwodna, aromat truskawkowy, aromat śmietankowy, woda oczyszczona.

Działania

Bufenik jest lekiem zmniejszającym ból, gorączkę oraz stany zapalne (niesteroidowy lek przeciwzapalny) i przeciwbólowy.

Przeciwwskazania - Bufenik, syrop, 200mg/5ml, 100 ml

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, potwierdzone reakcje skurczu oskrzeli, astmy, nieżyty nosa lub pokrzywki po wcześniejszym przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotok ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek lub ciężkie i niekontrolowane zaburzenia serca, ostatni trymestr ciąży.

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 7 kg (6 miesiąca życia), ze względu na niewystarczająco udokumentowane doświadczenia z udziałem młodszych dzieci.

Przeciwwskazania - Bufenik, syrop, 200mg/5ml, 100 ml

Często:

dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak zgaga, ból brzucha, mdłości, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, biegunka, zaparcie i niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego, które mogą powodować niedokrwistość w wyjątkowych sytuacjach

Niezbyt często:

ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie, reakcje nadwrażliwości z wysypką skórą i świądem, jak również napad astmy, zaburzenia widzenia, owrzodzenia przewodu pokarmowego

Rzadko:

szum lub brzęczenie w uszach

Bardzo rzadko:

- uszkodzenie nerek, szczególnie podczas leczenia długotrwałego
- zwiększone stężenie kwasu moczowego w krwi
- skąpomocz oraz gromadzenie wody w organizmie
- zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby
- zaburzenie układu krwiotwórczego
- ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka, objawy zapalenia opon mózgowych
- ciężkie reakcje nadwrażliwości
- zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, zawał
- wysokie ciśnienie
- powstawanie błoniastych przewężeń w świetle jelit

Uwagi

Lek nie powinien być dłużej stosowany niż 4 dni, a w większych dawkach bez konsultacji z lekarzem lub stomatologiem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.