

C-Vitum 1000 mg, 30 kapsułek



Nasza cena: 14,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	OLEOFARM POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

C-Vitum 1000 mg, 30 kapsułek

Suplement diety C-Vitum to aż 1000 mg kwasu L-askorbinowego w jednej kapsułce, co daje 1250% dziennego zapotrzebowania na witaminę C.

Preparat polecany jest **osobom dorosłym** w celu uzupełniania diety w witaminę C.

Składniki

kwas L-askorbinowy (witamina C), żelatyna (składnik otoczki), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:

1000 mg witaminy C (1250% referencyjnej wartości spożycia).

Masa netto

30 kapsułek

Właściwości składników

Witamina C wspomaga odporność i układ nerwowy. Wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym oraz produkcję kolagenu. Wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i utrzymanie odpowiedniego metabolizmu energetycznego.

Sposób użycia

Dorośli – 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Uwaga! Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.