


Calcium 500 D, 60 saszetek



Nasza cena: 47,38 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	Saszetki
Producent	Polfa Łódź S.a.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Dawkowanie - Calcium 500 D, 60 saszetek

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

- u dorosłych i młodzieży - 2 razy dziennie 1 saszetka; maksymalna dawka dobowa - 4 saszetki.
- u dzieci powyżej 3 lat - 1 raz dziennie 1 saszetka.

Zawartość saszetki rozpuścić w 3/4 szklanki wody, wymieszać i wypić.

Lek należy przyjmować między posiłkami.

Wskazane są okresowe przerwy w przyjmowaniu leku.

Składniki - Calcium 500 D, 60 saszetek

Wapń (Calcium) 500 mg

Witamina D3 (Cholecalciferolum 250 j.m.

Witamina C (Acidum ascorbicum) 60 mg

Działania

Calcium 500 D jest lekiem o skojarzonym działaniu wapnia, witaminy D3 i witaminy C.

Wapń jest składnikiem mineralnym uczestniczącym w tworzeniu i mineralizacji tkanki kostnej, zarówno w okresie wzrostu jak i w wieku dojrzałym.

Witamina D3 jest bioregulatorem przemian wapnia i fosforu, odpowiadającym za czynne wchłanianie jonów wapnia w przewodzie pokarmowym i wbudowywanie ich do tkanki kostnej.

Witamina C uczestniczy w procesie wytwarzania kolagenu, głównego składnika tkanki łącznej.

Wskazania - Calcium 500 D, 60 saszetek

Lek Calcium 500 D jest stosowany w:

- profilaktyce i leczeniu osteoporozy, osteomalacji i krzywicy,
- stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń,
- stanach niedoboru wapnia w organizmie (np. przy diecie, zespołach złego wchłaniania, nadużywaniu alkoholu, nałogowym paleniu tytoniu),

- rekonwalescencji po długotrwałym unieruchomieniu (np. po złamaniach kości).

Przeciwwskazania - Calcium 500 D, 60 saszetek

Leku Calcium 500 D nie należy stosować:

- przy uczuleniu na jakikolwiek składnik leku,
- u dzieci poniżej 3 lat,
- u osób mających wysokie stężenie wapnia we krwi,
- w niewydolności nerek z hiperfosfatemią,
- u osób z fenyloketonurią,
- u osób z hiperkalcurią,
- w kamicy nerkowej wapniowej.

Przeciwwskazania - Calcium 500 D, 60 saszetek

Po przyjęciu leku Calcium 500 D mogą pojawić się zaburzenia żołądkowo - jelitowe (wzdęcia, zaparcia, biegunki). U osób z niewydolnością nerek może wystąpić hiperkalcemia, tzn. wysoki poziom wapnia we krwi.

Uwagi

Lek należy przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i niedostępnym dla małych dzieci.

Więcej o wpływie wapnia na nasz organizm dowiedzą się Państwo z artykułu "Czy znasz objawy niedoboru wapnia w organizmie?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.