


Calcium Gluconicum Farmapol, 0,5 g, 50 tabletek



Nasza cena: 19,53 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 G
Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	FARMAPOL-POZNAN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CALCIUM

Opis produktu

Opis

Calcium Gluconicum Farmapol, 0,5 g, 50 tabletek

CALCIUM GLUCONICUM jest lekiem uzupełniającym niedobory wapnia w organizmie.

Dawkowanie

Dorośli: 1 do 2 tabletek 4 razy na dobę, po posiłku, popijając wodą.

Skład

1 tabletką zawiera:

45 mg jonów wapnia w postaci Calcii gluconas 500 mg; substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, talk, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa.

Działanie

Wapń jest niezbędnym składnikiem mineralnym organizmu. Stanowi ważny składnik tkanki kostnej, uczestniczy w działaniu układu nerwowego i mięśni. Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie. Pobudza mechanizmy obronne organizmu. Niedobór wapnia prowadzi do zaburzeń nerwowo-mięśniowych i demineralizacji kości.

Wskazania

Preparat stosowany w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży, karmienia piersią, rekonwalescencji, stanach niedoboru wapnia w organizmie (np. w wyniku zaburzeń wchłaniania, zwiększonego odkładania się wapnia w tkance kostnej). Leczenie osteoporozy różnego pochodzenia (także zapobiegawczo), tężyczki, oraz wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych (m.in. pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy), w leczeniu stanów zapalnych (np. w chorobach dróg oddechowych, gardła), złamań kości, demineralizacji kości.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sole wapnia, nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych, hiperkalcemia (nadmiar wapnia we krwi, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, hiperwitaminozą D, szpiczakiem lub przerzutami nowotworowymi do kości), ciężka hiperkalciuria, nadmiar wapnia w moczu, niewydolność nerek.

Nie podawać wapnia z dużymi dawkami witaminy D.

Niekiedy występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, zaparcia lub biegunka).

Duże dawki, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, prowadzą do hiperkalcemii, której objawami są: brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie mięśniowe, wielomocz, odkładanie związków wapnia (m.in. kamica nerkowa).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.