

Calperos Vita-D3, 500 mg + 2000 IU, tabletki do rozgryzania i żucia, 30 sztuk

Nasza cena: 34,84 zł



Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.DO ZUCIA
Producent	TEVA B.V. HOLANDIA [NL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CALCIUM CARBONICUM, WITAMINA D

Opis produktu

OPIS

Calperos Vita-D3 to produkt leczniczy łączący mineralne wapno i cholekalcyferol (witaminę D3), substancje ważne w procesie tworzenia się kości. Lek jest stosowany w leczeniu niedoboru wapnia i witaminy D u osób dorosłych.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: mineralne wapno i witamina D3 (Calcium + Cholecalciferolum).

Każda tabletki do rozgryzania i żucia zawiera: 500 mg wapnia (w postaci węglanu). 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2000 IU witaminy D3 (w postaci koncentratu cholekalcyferolu, w postaci proszku).

Substancje pomocnicze: Izomalt (E 953); Ksylitol (E 967); Sorbitol (E 420); Kwas cytrynowy; Monosodu cytrynian; Magnezu stearynian; Karmeloza sodowa; Aromat pomarańczowy "CPB" (zawierający substancje aromatyzujące pochodzenia naturalnego, mannitol, maltodekstrynę, glukonolakton, glikol propylenowy, alkohol benzylowy i sorbitol); Aromat pomarańczowy "CVT" (zawierający substancje aromatyzujące, mannitol, maltodekstrynę, glukonolakton, sorbitol i triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha); Krzemionka koloidalna uwodniona; Aspartam (E 951); Acesulfam potasowy (E 950); Sodu askorbinian; all-rac- α -Tokoferol; Skrobia kukurydziana modyfikowana; Sacharoza; Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha; Krzemionka koloidalna bezwodna.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie: Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku, przyjmują 1 tabletkę do rozgryzania i żucia na dobę, co odpowiada 500 mg wapnia i 2000 IU (jednostek międzynarodowych) witaminy D3.

Tabletkę należy żuć, a następnie połknąć. Można ją przyjmować o dowolnej porze, najlepiej z posiłkiem.

Działanie

Calperos Vita-D3 zawiera dwie substancje czynne wapń i witaminę D3. Witamina D3 uczestniczy w metabolizmie wapnia i fosforanów. Umożliwia czynne wchłanianie wapnia i fosforu z jelita oraz ich wychwyt przez kości. Suplementacja wapnia i witaminy D3 wyrównuje utajony niedobór witaminy D i wtórny hiperparatyroidyzm.

Wskazania

Calperos Vita-D3 jest wskazany w leczeniu niedoboru wapnia i witaminy D u osób dorosłych.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli pacjent: ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ma hiperkalciurię i hiperkalcemię i (lub) stany, które prowadzą do hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii (np. szpiczak, przerzuty raka do kości, pierwotny hiperparatyroidyzm, długotrwałe unieruchomienie, któremu towarzyszy hiperkalciuria i (lub) hiperkalcemia); ma kamice nerkową; ma wapnicę nerek; ma hiperwitaminozę D; ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Calperos Vita-D3 i zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia następującej reakcji alergicznej (występuje z nieznaną częstością): obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła z nagłymi trudnościami w oddychaniu i ciężką wysypkę.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób): duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub w moczu (hiperkalciuria).

Działania niepożądane występujące rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 osób): nudności, biegunka, ból brzucha, zaparcie, gazy, wzdęcia (uczucie rozpierania w brzuchu), wysypka, świąd, pokrzywka.

Działania niepożądane występujące o częstości nieznaney: zespół Burnetta (hiperkalcemia i zasadowica metaboliczna).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent: choruje na fenyloketonurię; przyjmuje jednocześnie glikozydy naparstnicy (digoksyna, digitoksyna) lub tiazydowe leki moczopędne z powodu problemów z sercem; ma zaburzenia czynności nerek; przyjmuje dodatkowe produkty zawierające wapń i witaminę D; ma sarkoidozę (zaburzenia układu odpornościowego, które może dotyczyć wątroby, płuc, skóry lub węzłów chłonnych).

Przed przyjęciem leku Calperos Vita-D3 należy zwrócić uwagę na ilość wapnia i substancji zasadowych (np. węglanów) pobieranych z innych źródeł (np. żywność, suplementy diety oraz inne leki). Równoczesne przyjmowanie produktów bogatych w wapń wraz z substancjami zasadowymi, takimi jak węglany, może prowadzić do wystąpienia zespołu Burnetta (hiperkalcemii i zasadowicy metabolicznej).

Podczas długotrwałego leczenia należy systematycznie sprawdzać stężenie wapnia we krwi i w moczu oraz badać czynność nerek.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje: glikozydy naparstnicy (digoksynę, digitoksynę); tiazydowe leki moczopędne, należy regularnie sprawdzać stężenie wapnia we krwi; antybiotyk; fluorek sodu (stosowany w celu wzmocnienia szkliwa zębów lub leczenia osteoporozy) oraz bisfosfoniary (stosowane w leczeniu osteoporozy); kolestyramin; fenytoinę (stosowaną w leczeniu padaczki) lub barbiturany (leki nasenne); glikokortykosteroid (np. kortyzon); lewotyroksynę (stosowaną w leczeniu niedoczynności tarczycy), lewotyroksynę należy stosować co najmniej 4 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu leku Calperos Vita-D.

Wapń może zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku i ranelinianu strontu. W związku z tym preparaty żelaza, cynku lub ranelinianu strontu należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu leku Calperos Vita-D3.

Stosowanie leku Calperos Vita-D3 może zmniejszyć wchłanianie i w ten sposób również skuteczność przyjmowanych jednocześnie niektórych antybiotyków (zwanymi tetracyklinami). Leki te należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub od 4 do 6 godzin po przyjęciu leku Calperos Vita-D3.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićm

Lek Calperos Vita-D3 należy przyjmować o dowolnej porze, najlepiej z posiłkiem.

Należy pamiętać, że kwas szczawiowy (zawarty w szpinaku i rabarbarze) oraz kwas fitynowy (znajdujący się w produktach pełnoziarnistych) mogą zmniejszyć ilość wapnia wchłanianego w jelicie. Leki zawierające wapń należy przyjmować z zachowaniem 2-godzinnej przerwy od spożycia żywności zawierającej duże ilości kwasu szczawiowego lub fitynowego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.