

Calpol 6+, zawiesina doustna, 250mg/5ml, 100 ml

Nasza cena: 21,88 zł



Opis słownikowy

Dawka	250MG/5ML
Opakowanie	100 ml
Postać	ZAWIESINA
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHN WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w gorączce w przebiegu przeziębienia lub grypy, przy bólach różnego pochodzenia: głowy i zębów, mięśniowych, stawowych, kostnych, po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych, przy bolesnym ząbkowaniu.

Dawkowanie - Calpol 6+, zawiesina doustna, 250mg/5ml, 100 ml

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Dawka jednorazowa wynosi od 500 mg do 1000 mg paracetamolu tj. od 10 ml do 20 ml Calpol 6 Plus. Dawkę można powtarzać co 4 godziny, do maksymalnej dawki dobowej paracetamolu tj. 80 ml leku Calpol 6 Plus.

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Dawkę ustala się wg masy ciała dziecka (przeciętnie jednorazowo od 10 do 15 mg/kg mc.), lub wg poniższego schematu. Od 250 mg do 500 mg paracetamolu, tj. od 5 ml do 10 ml leku Calpol 6 Plus.

W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę. U dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat wskazane jest stosowanie leku Calpol zawiesina doustna 120 mg/5 ml.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia powinno być zalecane przez lekarza. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 kolejne dni bez konsultacji z lekarzem.

Leku nie należy rozcieńczać.

Załączona miarka dozująca ułatwia odmierzenie dawki leku.

Składniki - Calpol 6+, zawiesina doustna, 250mg/5ml, 100 ml

5 ml zawiesiny zawiera jako substancję czynną 250 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze: syrop prosty, sorbitol 70%, zdyspergowana celuloza, glicerol, polisorbitat 80, parahydroksybenzoesan metylu, aromat cukrowy FP731, aromat pomarańczowy 510652 E, żółcień pomarańczowa E110, woda oczyszczona.

Działania

- przeciwbólowe
- przeciwgorączkowe

Wskazania - Calpol 6+, zawiesina doustna, 250mg/5ml, 100 ml

Gorączka występująca w przebiegu:

- przeziębienia
- grypy
- chorób wieku dziecięcego

oraz ból o małym lub umiarkowanym nasileniu tj:

- ból głowy
- ból zęba
- bóle mięśniowe, stawowe i kostne
- bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych

Przeciwwskazania - Calpol 6+, zawiesina doustna, 250mg/5ml, 100 ml

Nie należy stosować leku jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Przeciwwskazania - Calpol 6+, zawiesina doustna, 250mg/5ml, 100 ml

Paracetamol może powodować następujące działania niepożądane:

- reakcje nadwrażliwości: zaczerwienienie skóry, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, napad astmy oskrzelowej, obniżenie ciśnienia tętniczego aż do wystąpienia objawów wstrząsu
- układ pokarmowy: nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby
- układ krwiotwórczy: zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych w krwi, brak granulocytów we krwi, zmniejszenie liczby płytek krwi
- układ moczowy: kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

W okresie ciąży i karmienia piersią stosowanie możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.