

Canephron 60 tabletek



Nasza cena: 45,13 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	TABL.DRAZOW.
Producent	BIONORICA AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LEVISTICUM OFFICINALE, CENTAURIUM ERYTHR

Opis produktu

Opis

Canephron to tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawczo w osadzaniu się piasku nerkowego. Lek dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, w postaci tabletek drażowanych koloru pomarańczowego.

Wskazania:

Wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodne przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawczo w osadzaniu się piasku nerkowego.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 2 tabletki 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobową wynosi 6 tabletek).

Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości i popić niewielką ilością wody (np. szklanką wody).

Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Lek może być stosowany przez okres do czterech tygodni (po trzech tygodniach należy skonsultować się z lekarzem).

Terapię lekiem Canephron można powtórzyć u pacjentów, u których w przeszłości, w ciągu 3 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia, nie nastąpił nawrót infekcji dróg moczowych.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Składniki:

1 tabletkę zawiera: substancje czynne: 18mg Levisticum officinale Koch, radix (korzeń lubczyka), 18mg Centaurium erythraea Rafn s. l. włącznie z C. majus (H. et L.) Zeltner i C. suffruticosum (Griseb.) Ronn. (syn. Erythraea centaurium Persoon; C. umbellatum Gilibert; C. minus Gars.), herba (ziele centurii); 18mg Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu).

pozostałe składniki: węglan wapnia, olej rycynowy pierwszego tłoczenia, dekstryna, barwniki: żelaza tlenek czerwony (E 172), ryboflawina (E 101), tytanu dwutlenek (E 171), glukoza ciekła (substancja sucha), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, wosk Montana glikolowy, Powidon K 25, Powidon K 30, szelak, krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, talk.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.