

Canephron N krople doustne 1 ml/ml 100 ml

Nasza cena: 40,54 zł



Opis słownikowy

Dawka	1 ML/ML
Opakowanie	1 BUT.A 100ML
Postać	KROP.DOUSTNE
Producent	BIONORICA AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	EXTRACTUM COMPOSITUM EX:(.....)

Opis produktu

Opis

Canephron N to lek pochodzenia naturalnego, o unikalnej kombinacji składników , który:

- Wspomaga leczenie stanów zapalnych dolnych dróg moczowych
- Zapobiega nawrotom infekcji
- Wspomaga leczenie oraz zapobiega kamicy nerkowej i osadzeniu się piasku nerkowego.

Kombinacja składników pochodzenia naturalnego zawartych w leku Canephron N wykazuje szerokie spektrum właściwości farmakologicznych: przeciwzapalne, rozkurczowe, antybakteryjne oraz moczopędne.

Skład:

Rozmaryn:

Posiada liście w kształcie igieł o korzennym zapachu. Liście rozmarynu zawierają wysoką koncentrację olejków eterycznych, jak również garbniki i substancje gorzkie, które działają przeciwzapalnie, rozkurczowo i antybakteryjnie. Działa również moczopędnie..

Ziele tysiącznika (ziele centurii):

Osiąga wysokość do 50 cm, ma kwiaty w kolorze jasnoróżowym i różowym. Znaczenie mają w szczególności zawarte w niej substancje gorzkie. Działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i odprężająco na mięśnie pęcherza. Zwiększa objętość produkowanego moczu.

Lubczyk:

Znany również pod nazwą "magiczny krzew", to bylina osiągająca 2 metry wysokości. Posiada kwiaty koloru jasnożółtego tworzące

kwiatostan w kształcie baldachimu. Korzeń lubczyku zawiera olejki eteryczne z cennymi składnikami moczopędnymi; ma również działanie rozkurczowe i antybakteryjne. Jest tradycyjnie stosowany w chorobach dróg moczowych.

Sposób użycia:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Doustnie, 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem) po 74 krople, co odpowiada 5 ml w dawce jednorazowej.

Podczas stosowania zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.