

Captopril Polfarmex 12,5 mg 30 tabletek

Nasza cena: 6,65 zł

Opis słownikowy

Dawka	12,5MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	POLFARMEX S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	CAPTOPRILUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest zalecany do stosowania przez pacjentów u których występuje:

- nadciśnienie tętnicze,
- przewlekła niewydolność serca z osłabieniem czynności skurczowej komór,
- bezobjawowe zaburzenia czynności lewej komory po zawale mięśnia sercowego u pacjentów z ustabilizowanym stanem klinicznym,
- nefropatia cukrzycowa.

Dawkowanie:

Produkt może być stosowany przez pacjentów pod ścisłą kontrolą lekarza i według jego zaleceń:

Zalecana, maksymalna dawka dobową powinna wynosić 150 mg na dobę.

Nadciśnienie tętnicze:

Dawka początkowa wynosi od 25 do 50 mg, podawana 2 razy na dobę. Dawkę tę można zwiększać, jednakże stopniowo. Odstęp między kolejnym zwiększeniem dawki powinien wynosić co najmniej 2 tygodnie.

Niewydolność serca:

Dawka powinna zaczynać się od 6,25 mg, natomiast maksymalna dawka powinna wynosić 12,5 mg podawana 2-3 razy na dobę.

Działanie:

Hamuje przejście nieaktywnej angiotensyny I w aktywną angiotensynę II. U chorych z nadciśnieniem zablokowanie syntezy angiotensyny II powoduje spadek ciśnienia, zaś zahamowanie tkankowych systemów renina-angiotensyna zmniejsza przerost lewej komory. W niewydolności mięśnia sercowego w skutek zmniejszenia oporu obwodowego kaptopril zmniejsza pracę serca i poprawia stan chorego. W nefropatii cukrzycowej zmniejsza białkomocz.

Skład:

1 tabletkę zawiera 12,5 mg kaptoprylu.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu jeżeli u pacjentów występują którekolwiek z poniższych dolegliwości:

- nadwrażliwość na kaptopryl lub inny inhibitor ACE lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- obrzęk naczynioruchowy spowodowany leczeniem inhibitorami ACE,
- dziedziczny bądź samoistny obrzęk angioneurotyczny,
- II i III trymestr ciąży,
- karmienie piersią.
- jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z produktami zawierającymi aliskiren
- u pacjentów z cukrzycą
- u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane, do najczęstszych z nich należą:

- odczyny alergiczne skórne,
- obrzęk naczynioruchowy,
- zaburzenia smaku,
- zapalenie jamy ustnej,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- utrata apetytu,
- wymioty,
- zaparcia,
- bóle brzucha,
- suchy, męczący kaszel,

- zawroty i bóle głowy,
- uczucie zmęczenia,
- bezsenność,
- ból w klatce piersiowej,
- kołatanie serca.

Powyżej została wymieniona tylko część działań niepożądanych. W celu zapoznania się z innymi działaniami niepożądanymi należy zasięgnąć informacji lekarza prowadzącego lub też zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.