

Cefalgin, 10 tabletek



Nasza cena: 10,26 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Opakowanie | *10 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | POLFA PABIANICE POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | PARACETAMOLUM, PROPYPHENAZONUM, COFFEINU |

Opis produktu

Opis

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Dawkowanie - Cefalgin, 10 tabletek

Doustnie: Dorośli: 1-2 tabletek do 3 razy dziennie.

Nie stosować preparatu dłużej niż 7 dni.
Tabletki przyjmować po jedzeniu.

Składniki - Cefalgin, 10 tabletek

- 1 tabletką zawiera: 250 mg paracetamolu,
- 150 mg propyfenazonu,
- 50 mg kofeiny.

Działania

Cefalgin łączy w sobie działanie poszczególnych składników. Propyfenazon działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kofeina wykazuje działanie pobudzające na ośrodki: oddechowy, naczynioruchowy i nerwu błędnego.

Wskazania - Cefalgin, 10 tabletek

Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: nerwobóle, migrena, bolesne miesiączkowanie. Stany gorączkowe.

Przeciwwskazania - Cefalgin, 10 tabletek

Nadwrażliwość na składniki preparatu - szczególnie alergia pirazolowa.

Niedobór G-6-PD, ostra porfiria wątrobowa, niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza, ciężkie upośledzenie czynności wątroby i nerek, nadciśnienie tętnicze, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Nie stosować łącznie z innymi lekami z grupy pochodnych pirazonu.

Ostrożnie stosować w dusznicy bolesnej.

Ciąża i okres karmienia piersią.

W czasie leczenia mogą wystąpić: nudności, wymioty, dolegliwości dyspeptyczne, bóle brzucha i inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, ból głowy, bezsenność, drżenie mięśniowe, arytmia, reakcje nadwrażliwości, trombocytopenia, leukopenia, niedokrwistość aplastyczna, neutropenia, agranulocytoza, zapalenie trzustki, uszkodzenie wątroby lub nerek.

Interakcje

Lekarz powinien zdecydować czy pacjent może stosować lek Cefalgin jeśli jednocześnie stosuje następujące leki: ryfampicynę, niektóre środki nasenne, niektóre leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), chloramfenikol, doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, warfarynę, niesteroidowe leki przeciwzapalne, zydowudynę, środki działające uspokajająco (barbiturany i leki przeciwhistaminowe), benzodiazepiny, leki sympatykominetyczne (np. efedryna), tyroksynę, teofilinę, cymetydynę, disulfiram, doustne środki antykoncepcyjne. Wymienione leki należy stosować z lekiem Cefalgin ostrożnie ponieważ mogą wchodzić w interakcje z zawartymi w nim substancjami. W czasie stosowania leków spowalniających opróżnianie żołądka, takich jak np. propantelina, szybkość wchłaniania paracetamolu może ulec spowolnieniu, przez co efekt przeciwbólowy może wystąpić z opóźnieniem. Przyspieszone opróżnianie żołądka, np. po zażyciu metoklopramidu, prowadzi do szybszego wchłaniania paracetamolu.

Uwagi

Cefalgin nie powinien być stosowany w czasie ciąży.

Składniki - Cefalgin, 10 tabletek preparatu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.